



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





600043225M

$\frac{3}{2}$
44

G.106. P. $\frac{16}{1-2}$



E. BIBL. RADCL.


~~33 E 302~~
~~1-2~~

~~X~~ C


189493 e.56












MONOGRAPHIA
STAPHYLINORUM
SVECICÆ

A

GUSTAVO DE PATKULL.



UPSALIÆ,
LITTERIS DIRECT. JOHANN. EDMAN, MDCCLXXXIX.



VIRO

ILLUSTRI ac CELEBERRIMO

DOMINO

JOHANNI CHRIST.


FABRICIO,

PROF. KILONIENSI, PLUR. ACADEM. ET SOC.

LITT. MEMBRO.

AMICO OPTIMO

SACRUM.



VIRO

ILLUSTRI ac CELEBERRIMO

DOMINO

JOHANNI CHERIST.


FABRICIO,

PROF. KILONIENSI, PLUR. ACADEM. ET SOC.

LITT. MEMBRO.

AMICO OPTIMO

SACRUM.



LECTORI.

Faunam Svecicam ab immortali nostro LINNÆO editam, non exiguam, maxime quod ad insecta & vermes, desiderare emendationem, jam diu non immerito questu sunt rerum naturalium scrutatores. Ardentius hanc historiæ naturalis partem excolendi studium, ab Illustri hoc Viro in primo quasi diluculo accensum, numerum specierum in plerisque generibus fere duplicavit, unde characteres etiam antea determinati facti sunt vacillantes. LINNÆUS laboribus obrutus descriptiones suas maxima, qua fieri potuit, brevitate adornavit. Pauca tunc verba ad speciem aliquam determinandam forte sufficiebant, quando plures, eidem admodum adfines, nondum erant cognitæ. His autem detectis, priores adeo insufficientes sunt descriptiones, ut conjectandum non raro, atque ab exterorum aucto-

rum synonymiis indagandum sit, quam in primis speciem Archiater illustris indicare voluerit.

DE GEER, auctor eodem tempore florens, defectus Faunæ Sveciæ dudum cognovit. Nomina igitur LINNÆANA apud ipsum non raro desiderantur, atque interdum speciebus alienis sunt addita. Absit quam longissime ut Reaumurii nostri Svecani gloriam obscurare vellem: indefessam ejus inquirendi, & solidam dijudicandi facultatem, naturæ ubique, non vero soli nomenclaturæ intentam, semper laudabunt, semper admirabuntur, raro imitari poterunt eruditi. Attamen in observandis magis quam colligendis hisce naturæ miraculis occupatus DE GEER, non admodum multas species LINNÆO incognitas in operibus suis descripsit.

Plures recentioris ævi scriptores, novis Insectorum Svecicorum descriptionibus, partim

tim in Actis Academiae Scientiarum, partim in singularibus disertationibus, defectum hunc supplere sunt conati; neque negari potest quidquam hac diligentia esse effectum, quamvis minus omnino, quam primo forte intuitu sperari posset. Difficultas erit enim non levis plura Academicorum trimestria, aut plures diversi argumenti disertationes evolvere, ut insectum aliquod quæramus minus cognitum, antea sæpe nomine magis exteris entomologis noto, vel ab ipso interdum LINNÆO descriptum.

Edebat interea BONSDORFF Academiae Aboënsis Professor, suas de Curculionibus Svecicis disertationes, suoque exemplo genera Insectorum difficiliora per monographias pertractare docuit. Descriptiones ejus cum Synonymis auctorum ab ipso examinatis magnam habent laudem. Unum forte

vel alterum addi potuisset: sed Scientia tamen non sine causa continuationem hujus laboris, qui non ultra levisimam divisionem, seu Curculiones breviostres sese extendit, intermissam queritur.

Præter defectum hunc descriptionum entomologorum satis perspicuum, aliam quoque deprehendimus difficultatem. Genera a LINNÆO recepta vacillant sæpe, & naturæ interdum repugnant. Dermestes, Tenebrio, Attelabus, Cancer, cetera testimonio esse poterunt, neque multos harum rerum peritos habebo contradicentes. Classes ipsæ apud LINNÆUM minus bene sunt determinatæ. Cur enim e. gr. Aptera a reliquis separantur, cum in omnibus classibus insecta sine alis inveniuntur? Exiguæ Systematis LINNÆANI emendationes, a recentioribus nonnullis factæ, vix commemorari debent, utpote infirmiores ædificii minus solidæ fundati reparationes.

FA.

FABRICIUS, Academiae Kiloniensis Professor, qui inter omnes maximum vidit ac descripsit insectorum numerum, atque ideo defectus prioris systematis optime perspexit, novum orbi erudito systema dedit, structura instrumentorum cibariorum fundatum. Multa huic objici audi: sed cum mammalia & aves ex structura dentium & rostri distingvere non dubitaverint Historici Naturales, cur non eodem modo in divisione insectorum naturæ sequi licebit vestigia? Subtilitas partium magnam interdum, fateor, difficultatem creat: sed hæc tamen neminem abstertere debet, postquam MULLER Zoologus Hassnienfis, ipsa animalcula microscopica, quæ oculis nudis conspici nequeunt, & instrumentis cibariis omnium insectorum huc usque descriptorum infinite minora sunt, in sua genera, suasque species dispescere potuit. Qui præterea systematis FABRICIANI paulo adcuratiorem nactus est

cognitionem, habitum naturalem per omnia fere ita observatum inveniet, ut hoc ipso haud parum minuantur difficultates. Si autem numerus generum loco quodam præter necessitatem contra habitum hunc naturalem auctus videretur, erratum hoc facile corrigere quisque poterit. Non igitur e. gr. vestigiis memorati auctoris insistens Staphylinos in tria genera distingvere ausus sum.

Postquam per instituta longe lateque intra patriam, itinera & benignam aliorum entomologorum operam, insectorum ple-
rorumque in Svecia inventorum ipse factus sum possessor, genera, quæ plurimas præbere videbantur difficultates, & maximam novarum specierum copiam ostendebant, passim describere decrevi.

A Staphylinis initium facio. Curculio-
nes, Carabos, Phryganeas, Ichneumones,
Ten-

Tenthredines, Noctuas, Phalænas, Pyralides, Tineas, Muscas, cet. postmodum pertractare est animus. Genus unumquodque singulatim editur, sed æquali forma, ut postmodum eadem ligatura plura possint conjungi.

Descriptiones summa, qua fieri potuit, ad curatione formare sum conatus: characteres a solo colore non desumfi, ubi aliarum fuit notarum copia. Sic vero specierum ex meris sæpe varietatibus formationem alicubi forte vitare potui. Varietates tamen ubique simul descripsi.

Ne multis præter necessitatem, citationibus nimium crescat labor, quod ad Synonymiam attinet, FABRICII opus recentissimum seu Mantisfam Insectorum, LINNÆI Systema Naturæ & Faunam Svecicam, DE GEERII Histoire des Insectes unice citavi; præter illos casus, ubi insecta ab his aucto-

auctoribus non fuerunt descripta, aut alii
eorundem dederunt figuras coloribus vi-
vis pictas.

Insectorum, quæ tractantur, domicilia
ubique annotare studui; in oeconomiam au-
tem ulteriorem nunc inquirere nolui. Ob-
servationes, quas in hac entomologiæ par-
te præcipua instituere potui, alia vice pu-
blici juris faciam.

Suis laborare nævis hanc meam operam
non dubito. Novas igitur observationes &
illustrationes ab omnibus hujus Scientiæ
cultoribus enixe mihi expeto, hisque me
maximopere obstrictum profiteor.

*Dab. in Prædio Hesselby prope Upsaliam
die 20 Maji 1789.*

STA-

STAPHYLINUS.

ANTENNÆ moniliformes.

ELYTRA abbreviata alas obtegentia.

TARSI quinquearticulati.

CAUDA simplex, exserens duas vesiculas oblongas.

LINNÆUS, qui semper alioquin in plures divisiones majora distinxit genera, in ultima systematis sui editione viginti sex tantum descripsit Staphylinos, eamque forte ob causam genus hoc in plures dispescere noluit familias.

FABRICIUS vero, qui quadraginta quinque descripsit, in quibus tamen nonnulli, si dicere hoc liceat, meræ sine dubio sunt varietates, tria eorum constituit genera. Ipsum, hac in re, ut antea indicavi, sequi non audeo, neque his generibus tanquam subdivisionibus facile uti possum, cum primum genus solum, seu Staphylini ejus proprie sic dicti, quadruplo fere majorem contineant numerum specierum, quam reliqua duo genera, seu Oxypororum & Pæderorum simul sumta. Alii Entomologi hoc genus in species majores & minores diviserunt; alii in Staphylinos thorace æqua-

THORAX niger, supra, margine postico excepto, lanugine flava tectus, antice angulatus, postice rotundatus, longitudine capitis.

ELYTRA lanuginosa, antice nigra, postice cinerascens, thorace longiora.

STERNUM violaceum, nitidum.

ABDOMEN longitudine thoracis elytrorumque, supra antice nigrum, postice flavo-lanuginosum, subtus violaceum, nitidum, maculis paucis flavis, lanuginosis.

PEDES nigri.

LOCUS: In Scaniae Sabuletis rarior.

OBS. *Lanugo flava interdum aetate deteritur.*

SYNON. FABRICII MANT. *Inf.* p. 219, N:o 2. *St. Hirtus.*

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 683. N:o 1. *Faun. Suec.* N:o 839. *St. Hirtus.*

DE GEER *Hist. des Inf.* t. 4. p. 20. N:o 5. *St. Bombilius.*

SCHAEFF. *Icon.* T. 36. f. 6.

N:o II.

STAPHYLINUS MAXILLOSUS.

*Niger, nitidus, abdomine elytrisque
fasciis cinereis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum, thorace latius;
Maxillæ longissimæ; *Antennæ*
nigro-fufcescentes, extrorsum
crassiores, capite longiores.

THORAX niger, nitidus, antice truncatus,
angulatus, postice rotundatus,
longitudine capitis.

ELYTRA nigra, fascia in medio sinuata,
lanuginosa, cinerea, punctis ali-
quot minutis, nigris; subtus
violacea, nitentia.

ALÆ albæ, macula marginali nigra.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN supra nigrum, maculis quibus-
dam lanuginosis, cinereis; sub-
tus nigrum, fascia lata, lanu-
ginosa, cinerea.

PEDES nigri.

LOCUS: Habitat in fimetis & quisquiliis; in ca-
davere serpentis semel magnam e-
jus copiam inveni.

OBSERV. *Lanugo cinerea interdum atate evanescit.*

SYNON. FABR. MANT. *Inf.* p. 220. N:o 5. *St. Maxillofus*.

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 683. N:o 3. *Famn. Sv.*
N:o 841. *St. Maxillofus*.

DE GEER *Hist. des Inf.* 4. p. 18. N:o 4.
St. Balteatus.

SCHÆFF. *Icon. T.* 20. f. 1.

N:o III.

STAPHYLINUS ERYTHROPTERUS.

*Niger, maculis lanuginosis, nitentibus,
flavis, elytris, antennarum basi,
pedibusque rufis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace latius, nigrum, supra lanugine brevissima, flava, certo situ auri instar micante tectum; *Palpi* rufi; *Antennæ* rufæ, apice fuscescentes, filiformes, capite duplo longiores.

THORAX niger, lanugine brevissima flava, præsertim margine nitente, capite longior, antice truncatus, angulatus, postice rotundatus.

ELYTRA rufa, thorace paulo longiora.

ALÆ rufescentes, præsertim margine exteriori, absque puncto marginali nigro.

STERNUM nigrum, maculis lanuginosis, flavis.

ABDOMEN nigrum, maculis paucioribus, lanuginosis, flavicantibus.

PEDES rufi.

Locus: In fimetis & agaricis putridis.

B 2

OBS.

OBSERV. *Lamugo flava* interdum exteritur.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 220. N:o 8. *St. Erythropterus*.

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 683. N:o 4. *Faun. Svec.* N:o 842. *St. Erythropterus*.

DE GEER *Hist. des Inf.* 4. p. 21. N:o 6. *St. Erythropterus*.

SCHÆFF. *Icon. Inf.* t. 2. fig. 2.

N:o IV.

STAPHYLINUS OLENS.

Niger, opacus, immaculatus, antennis apice lunatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace latius; *Antennæ* capite duplo longiores, ultimo articulo lunato.

THORAX niger, depressus, longitudine capitis, antice truncatus, angulatus, postice rotundatus.

ELYTRA nigra, depressa, longitudine thoracis.

STERNUM nigrum; nitidiusculum.

ABDOMEN nigrum, depressum, marginatum, elytris quadruplo longius.

PEDES breviores, nigri.

LOCUS: In Scania rarius habitare fertur; in Europa australi frequens.

OBSERV. *Magnitudo: longitudine omnes nostros superat, latitudine St. Maxillosum æquiparat. Ab illustr. a LINNÉ falso pro var. St. Maxillofi habitus.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 219. N:o 4. St. Olen.*

DE GEER *Inf. 4. p. 22. N:o 3. St. Major niger.*

N:o v.

STAPHYLINUS SIMILIS.

*Niger, immaculatus, capite thorace-
que politis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace latius, nigrum, nitidum; *Antennae* filiformes, capite duplo longiores.

THORAX niger, nitidus, longitudine fere capitis.

ELYTRA depressa, nigra, opaca, thorace paulo longiora.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN depressum, nigrum, opacum, elytris triplo longius.

LOCUS: Habitat in Svecia australi rarius.

OBSERV. *Magnitudo: dimidia precedentis, a quo etiam differt capite thoraceque politis, abdomineque, respectu elytrorum, brevior.*

SYNON. DE GEER *Inf.* 4. p. 22. N:o 7. *St. minor niger?* sed minime *St. Politus* LINNÆI.

SCHÆFF. *Icon.* t. 30. N:o 12.

N:o VI.

N:o VI.

STAPHYLINUS ÆNEOCEPHALUS.

*Nigro-fuscus, elytris rufescentibus,
capite thoraceque æneis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace paulo latius, æneum, punctis minutissimis, confertissimis, & 4 vel 6 majoribus excavatis; *Palpi* breves, fusco-rufescentes; *Maxillæ* nigræ; *Oculi* disco nigri, margine pallidi; *Antennæ* filiformes, fusco-rufescentes, longitudine fere dupla capitis.

THORAX capite longior, antice truncatus, postice rotundatus, punctis minutissimis, confertissimis disco, & quibusdam paulo majoribus, marginalibus, excavatis.

ELYTRA fusco-rufescentia, thorace breviora.

STERNUM fuscum, opacum.

ALÆ albæ, costæ, punctoque marginali rufescentibus.

ABDOMEN elytris triplo fere longius, fuscum, lineis quinque obsoletis, pallidioribus.

PEDES fusco-rufescentes.

Locus: In fimetis Uplandiæ.

OBSERV. *Magnitudo & Statura omnino præcedentis, ut diu basitaverim, utrum species distincta, an varietas esset, sed quoniam color omnino differt, nec mixti unquam occurrunt, vix dubitare licet, quin distingui mereantur.*

SYNON. DE GEER Inf. 4. p. 22. N:o 8. St. *Æneocephalus*.

N:o VII.
STAPHYLINUS CYANEUS.

*Niger, capite, thorace, elytrisque
cyaneis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace latius, supra cyaneum, subtus nigrum, nitidum; *Oculi* disco nigri, margine pallidi; *Maxillæ Palpique* nigri; *Antenna* filiformes, capite duplo longiores, nigræ.

THORAX longitudine capitis, convexus, antice obtusus, postice rotundatus, cyaneus.

ELYTRA cyanea, longitudine thoracis.

SCUTELLUM nigrum.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, elytris plus duplo longius.

PEDES nigri.

LOCUS: Habitat rarissime in insula Vermdön, Dom. ÖDMANN; in Finlandia, Dom. MODEER.

OBSERV. Magnitudo & statura *St. erythropteri*.

SYNON. GEOFFROY *Hist. des Inf. t. 1. p. 361. N:o 2. St. Atro-coeruleus.*

STAPHYLINUS MURINUS.

Cinereus, pubescens, æneo nigroque nebulosus, abdomine conico, apice pedibusque nigris.

DESCRIPTIO.

CAPUT depressum, latitudine thoracis, subtilissime punctatum, subæneum; *Palpi* nigri; *Oculi* brunnei; *Antennæ* filiformes, rufescentes, apice nigræ, capite duplo longiores.

THORAX longitudine capitis, antice angulatus, truncatus, postice rotundatus, cinereo-pubescens, maculis æneis nigrisque tessellatus.

STERNUM nigrum, lanugine cinerea, certo situ splendente tectum.

ELYTRA thoracis longitudine, supra æneo-cinerascentia, maculis tessellatis, nigris, subtus cyanea, nitida.

ALÆ abdomine longiores, apice nigrescentes, macula marginali nervisque nigris.

ABDOMEN conicum, longitudine fere dimidii corporis, dorso, basi cinereo-æneum, maculis nigris
tes-

tesfellatis, apice totum nigrum;
 subtus nigrum, lanugine cine-
 rea in marginibus segmentorum
 perlucante.

PEDES nigri.

Locus: Hab. in fimetis ubique.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 219. N:o 3. *St. Murinus*.

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 683. N:o 2. *Faun. Sv.*
 N:o 840. *St. Murinus*.

DE GEER *Inf.* 4. p. 12. N:o 1. *St. Villosus*.

STAPHYLINUS PUBESCENS.

*Niger, nebulosus, capite femoribusque
annulo flavo-ferrugineo, ab-
domine obtuso.*

DESCRIPTIO.

CAPUT flavo-lanuginosum, latitudine thoracis; *Palpi Maxillæ* nigri; *Antennæ* capite duplo longiores, extrorsum crassiores, basi flavæ, apice nigricantes.

THORAX capite longior, antice truncatus, postice rotundatus, niger, lanugine brevissima, ferruginea, parcius tesfellatus.

ELYTRA thorace longiora, nigra, maculis paucioribus, lanuginosis, ferrugineis.

ABDOMEN obtusum, elytris vix duplo longius, dorso nigro, ferrugineo, parum lanuginoso, subtus nigrum lanugine densa, cinerea, certo situ micante, tectum.

PEDES fusci, annulo femorali ferrugineo.

LOCUS: Habit. in Scania rarius. Dom. QUENTZEL. E Gallia mihi a Dom. D'ANTIC misus.

OBSERV. *A priori, cui magnitudine & Statura similis est, colore & abdomine obtuso omnino differt.*

SYNON. DE GEER *Inf. 4. p. 17. N:o 2. St. Pubescens.*
GEOFF. *Inf. t. 1. p. 363. N:o 8. St. Pubescens.*

N:o x.

STAPHYLINUS RUFUS.

*Glaber, rufus, capite, sterno, ano
elytrisque postice nigris.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum, thorace latius;
Maxillæ validissimæ, capitis longi-
tudine; *Palpi* rufi, inæquales:
anteriorēs filiformes, posteriorēs
securiformes; *Antennæ* basi
rufæ, apice fuscæ, breviores;
extrorsum crassiores.

THORAX rufus, glaber, capite brevior,
antice truncatus, angulatus, pos-
tice rotundatus.

STERNUM nigrum, nitidum.

ELYTRA nigra: basi angulo exteriore ma-
cula magna, rufa, quæ tamen
marginem interiorem haud at-
tingit.

ABDOMEN conicum, rufum, apice nigrum.

PEDES rufi, femoribus omnibus basi
nigris.

Locus: Hab. in boletis.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 222. N:o 1. *Oxyporus*
rufus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 684. N:o 6. *Faun. Svec.*
N:o 844. *St. Rufus.*

DE GEER *Hist. des Inf.* 4. p. 24. N:o 10.
St. Rufus.

SCHÆFF. *Icon. Inf.* t. 85. f. 3.

N:o xi.

N:o XI.

STAPHYLINUS CARABOIDES.

Depressus, rufo-flavus, elytris pedibusque pallidioribus, antennis longioribus.

DESCRIPTIO.

CAPUT vix thorace latius, obscure rufum; *Antennae* paulo dilutiores, longitudine fere corporis, filiformes; *Oculi* globosi, nigri, prominentes.

THORAX rufus, capite longior, rotundatus, postice paulo angustatus.

STERNUM rufo-flavum.

ELYTRA depressa, testacea: capitis thoracisque longitudine.

ABDOMEN breve, antice rufo-flavum, postice fuscum.

PEDES testacei.

Locus: Habitat in putridis, sub foliis disjectis vere & autumnno, & intra folia arborum aestate convoluta, frequens.

OBSERV. *Color rufo-flavus in brunneum interdum magis transit.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 222. N:o 33. *St. Caraboides.*

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 685. N:o 20. *Faun. Svec.* N:o 854. *St. Caraboides.*

DE GEER *Hist. des Inf.* 4. p. 25. N:o 12. *St. Fulvus.*

N:o XII.

STAPHYLINUS PICEUS.

*Niger, thorace depresso: lineis elevatis
tribus, elytris piceis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, rugosum, thoracis latitudine; *Antennæ* extrorsum crassiores, longitudine capitis thoracisque.

THORAX niger, depressus, submarginatus, rugosus, lineis tribus elevatis, longitudinalibus, antice truncatus, angulatus, postice rotundatus.

ELYTRA picea, rugosa, truncata, longitudine thoracis.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, longitudine dimidii corporis.

PEDES pallidi.

LOCUS: Habitat frequens in stercore bovino.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 222. N:o 35. *St. Piceus*.
LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 686. N:o 25. *St. Piceus*.

VAR. β .

Niger, immaculatus, rugosus.

LOCUS: Habitat rarius cum præcedente.

OBSERV. Paulo major, at Statura & Fabrica omnino eadem.

SYNON. FABR. *MANT. Inf.* p. 222. N:o 34. *St. Rugosus*.

N:o XIII.

STAPHYLINUS BICOLOR.

Fusco-griseus, capite, thorace abdomineque supra nigris.

DESCRIPTIO.

CAPUT thoracis latitudine, nigrum, convexum: pilis rarioribus; *Antenne* fuscæ, vix extrorsum crassiores, capitis thoracisque longitudine.

THORAX niger, convexus, (non vero gibbus), immarginatus, postice rotundatus.

ELYTRA fusco-grisea, subpunctata, longitudine thoracis, postice truncata, angulis obtusis.

STERNUM griseo-fuscum.

ABDOMEN marginatum, thorace elytrisque paulo longius; supra nigrum, subtus griseo-fuscum.

PEDES fusco-cinerascentes.

LOCUS: Habitat in fimetis parcius.

OBSERV. *Colore & magnitudine omnino St. Piceï, sed lævis, & thorax baud depressus.*

C

N:o XIV.

STAPHYLINUS FULGIDUS.

Elongatus ater, nitidus, elytris, pedibus, abdominisque apice rufis.

DESCRIPTIO.

CAPUT thoracis latitudine, oblongum, punctulatum, nigrum, nitidum; *Antennæ* rufo-fulcescentes, filiformes, capite longiores.

THORAX longitudine capitis, convexus, submarginatus, niger, nitidus, antice truncatus, angulatus, postice rotundatus.

STERNUM nigrum.

ELYTRA rufa, thoracis longitudine.

ALÆ fulcescentes.

ABDOMEN elytris triplo longius, nigrum, summo apice rufo.

PEDES rufi.

Locus: Habitat in fimetis.

OBSERV. Magnitudo: longitudine *St. Murini*, at triplo angustior.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 220. N:o 14. St. Fulgidus.

VAR. β.

Elongatus ater: elytris pedibusque testaceis.

OBSERV. Paulo minor, sed fabrica & statura omnino eadem, ut non distingui mereantur; præcedente multo varior.

N:o xv.

STAPHYLINUS TRICOLOR.

Elongatus niger, elytris pedibusque rufis, thorace antice rubro.

DESCRIPTIO.

CAPUT oblongum, nigrum, nitidum, punctulatum, thoracis latitudine; *Antenna* vix extrorsum crassiores, capite longiores.

THORAX capite paulo brevior, nitidus, antice truncatus ruber; postice subattenuatus, rotundatus, niger.

ELYTRA rufa, longitudine thoracis.

STERNUM rufescens.

ALÆ rufescentes.

ABDOMEN dorso nigrum, summo apice subtusque rufescens, elytris triplo longius.

PEDES rufi.

LOCUS: Habitat in fimetis.

OBSERV. *Statura precedentis, sed differt magnitudine paulo minori, thoraceque postice attenuato, antice rubro. An hic esset diu basi, sed FABRICIUS ipse dubia mea litteris suis profligavit: minus igitur accurate ejus descriptio quadrat. Forsan varietatem, thorace toto rubro, ill. Auctor vidit, quæ mihi non occurrit.*

SYNON. FABR Mant. Inf. p. 221. N:o 30. St. Tricolor.

C 2

N:o XVI.

STAPHYLINUS AFFINIS.

*Elongatus rufo-fuscus, nitidus, subtus
dilutior, palpis filiformibus.*

DESCRIPTIO.

CAPUT latitudine thoracis, elongatum, declive, subpilosum; *Oculi* nigri, minuti; *nucha* magis nigricans, subtus magis rufescens; *Antennæ* capite longiores, extrorsum paulo crassiores, rufescentes; *Palpi* filiformes.

THORAX rufo-fuscus, nitidus, subtus dilutior, convexus, immarginatus, postice rotundatus, vix capite longior.

ELYTRA rufo-fuscescentia, inangulata, longitudine & latitudine thoracis.

STERNUM rufum.

ABDOMEN cylindricum, dorso rufo-fuscum; subtus dilutius, longitudine fere dimidii corporis, latitudine thoracis.

PEDES breves, rufi.

Locus: Habitat in fimetis.

OBSERV. *Statura omnino præcedentis, at paulo minor, nec collari sanguineo; forsan tantum varietas sexus.*

N:o xvii.

STAPHYLINUS ELONGATUS.

*Niger, pedibus elytrisque postice rufis,
palpis anterioribus clavatis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thoracis latitudine, nigrum, subpunctatum; *Antennæ* filiformes; rufescentes, capitis thoracisque longitudine; *Palpi* anteriores clavati, posteriores filiformes.

THORAX niger, subpunctatus, antice posticeque rotundatus, inangulatus, longitudine capitis.

ELYTRA thoracis longitudine, antice nigra, postice obscure rufa.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN cylindricum, nigrum, vix longitudine dimidii corporis.

PEDES rufi.

LOCUS: Hab. in stercore. & sub lapidibus sat frequens.

OBSERV. *Statura præcedentium, at distinctus palpis clavatis, & elytris antice nigris.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 223. N:o 3. *Paderus elongatus.*

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 685. N:o 14.

STAPHYLINUS RUFICOLLIS.

*Niger, elytris coeruleis, femoribus-
que basi rufis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum, subpunctatum, thoracis latitudine; *Antennæ* filiformes, capite thoraceque longiores, nigræ, basi pallidæ; *Palpi* anteriores clavati, rufi: clava nigra, posteriores filiformes.

THORAX globosus, rufus, capitis longitudine.

ELYTRA violacea, nitida, punctata, thorace paulo longiora.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, cylindricum, dimidio corpore longius: setis longioribus.

PEDES nigri, femoribus basi rufis.

Locus: In Scania rarius habitare fertur; in Holfatia frequens sub lapidibus littoralibus.

OBSERV. *Magnitudo & Statura præcedentis.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 223. N:o 2. Paderus ruficollis.*

GEOFFROY *Hist. des Inf. T. I. p. 370. N:o 23. St. Atro-coerulefcens thorace rubro.*

N:o XIX.

STAPHYLINUS RIPARIUS.

*Rufus, elytris coeruleis; capite, sterno,
geniculis abdominisque apice nigris.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thoracis latitudine; *Palpi* rufi: anteriores clavati: clava nigra, posteriores filiformes; *Antennae* filiformes, nigræ, basi rufescentes, capite thoraceque paulo longiores.

THORAX ovalis, convexus, rufus, capite paulo longior.

ELYTRA violacea, thorace paulo longiora.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN longitudine dimidii corporis, rufum: duobus ultimis segmentis nigris.

PEDES rufi, geniculis nigris.

LOCUS: Habitat ad ripas arenosas.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 223. N:o 1. Pæderus riparius.*

LINN. *Syst. Nat. 2. p. 684. N:o 8. Faun. Svec. N:o 846. St. riparius.*

DE GEER *Hist. des Inf. t. 4. p. 28. N:o 14. St. riparius.*

SCHÆFF. *Icon. T. 71. fig. 3.*

STAPHYLINUS TESTACEUS.

*Testaceus, glaber, capite rufo, oculis
nigris.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thoracis latitudine, convexum, rufum; *Oculi* minutissimi, nigri, *Antenna* filiformes, capitis thoracisque longitudine; *Palpi* anteriores clavati; posteriores filiformes.

THORAX testaceus latitudine paulo longior.

ELYTRA testacea, magnitudine thoracis.

STERNUM testaceum.

ABDOMEN thorace elytrisque paulo longius, testaceum, marginibus segmentorum dorso paulo rufescentibus.

PEDES breves, testacei.

OBSERV. *Statura & magnitudine omnino sequentis. Non nisi unicum vidi: forsan varietas, aut nuper e nympha declaratus colorem in statu adultiori forte mutaturus.*

N:o XXI.

STAPHYLINUS QUADRATUS.

Niger, nitidus, immaculatus, thorace quadrato, palpis anterioribus clavatis, antennarum articulis subæqualibus.

DESCRIPTIO.

CAPUT latitudine thoracis, nigrum, pilis rarioribus; *Antennæ* filiformes: articulis subæqualibus, longitudine dimidii corporis; *Palpi* anteriores clavati; posteriores filiformes.

THORAX quadratus, angulis obtusis, niger, nitidus, elytrorum fere magnitudine.

ELYTRA nigra, subquadrata.

STERNUM nigrum.

ALÆ albæ.

ABDOMEN nigrum, longitudine thoracis elytrorumque, fetis longioribus.

PEDES *Femora & Tibiæ* nigra; *Tarsi* fuscescentes.

LOCUS: Hab. in fimetis.

OBSERV. *Magnitudo & habitus St. riparii.*

VAR. β.

Niger immaculatus, pedibus rufis.

LOCUS: Habitat cum præcedente, sed multo rarior, nec distinctus specie, cum fabrica omnino sit eadem.

C 5

N:o XXII.

N:o XXII.

STAPHYLINUS PUNCTULATUS.

Niger, capite, thorace elytrisque punctatis, palpis filiformibus, primo articulo antennarum reliquis duplo longiore.

DESCRIPTIO.

CAPUT thoracis latitudine, declive, nigrum, confertissime punctatum; *Palpi* filiformes; *Antennæ* capite paulo longiores: primo articulo reliquis duplo longiore.

THORAX niger, nitidus, longitudine capitatis, punctatus, antice! truncatus, postice rotundatus.

STERNUM nigrum.

ELYTRA nigra, punctulata, thorace paulo longiora.

ALÆ albæ.

ABDOMEN nigrum, cylindricum, longitudine fere dimidii corporis.

PEDES nigri, interdum fuscescentes.

LOCUS: Habitat in fimetis rarius.

OBSERV. *Differt a priori, cui magnitudine & colore omnino similis, quod punctatus, quod caput magis declivum, thorax magis rotundatus, palpi omnes filiformes, & primus articulus antennarum reliquis duplo longior fit.*

N:o XXIII.

N:o XXIII.

STAPHYLINUS CANALICULATUS.

Rufo-flavus, capite abdominisque apice nigris, thorace postice canaliculato.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thoracis latitudine; *Antennæ* extrorsum crassiores, capite thoraceque longiores, basi rufo-flavescentes, apice fuscae; *Palpi* æquales filiformes, rufo-flavescentes.

THORAX flavo-rufescens, rotundatus, postice medio canaliculatus, elytrorum longitudine.

STERNUM rufo-flavescentis.

ELYTRA breviora, flavo-rufescentia.

ABDOMEN marginatum, reliquo corpore longius, basi rufo-flavum, apice nigrum.

PEDES rufo-flavi.

LOCUS: Habitat sub lapidibus, & foliis putridis, tempore autumnali & primo vere satis frequens.

OBSERV. *Magnitudo precedentibus minor. Color rufo-flavus interdum magis obscurus.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 221. N:o 29. St. Canaliculatus.*

N:o XXIV.

STAPHYLINUS SULCATUS.

Niger glaber, thorace longitudinaliter unisulcato.

DESCRIPTIO.

CAPUT vix thorace latius, nigrum; *Antennæ* fuscescentes, extrorsum crassiores, capite thoraceque longiores.

THORAX niger, cordatus, per totam longitudinem profunde sulcatus.

ELYTRA thoracis longitudine sed latiora, nigra, convexa.

STERNUM nigrum.

ALÆ albæ, hyalinæ, abdomine longiores.

ABDOMEN nigrum, longitudine dimidii corporis.

PEDES fusci, interdum minus, interdum magis flavescentes.

LOCUS: Habitat in Uplandia rarius.

OBSERV. *Magnitudo: inter minimos est, & præcedente quadruplo minor.*

N:o xxv.

STAPHYLINUS JUNO.

*Niger, oculis magnis, prominentibus,
antennis clavatis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, breve, thorace latius, subtilissime punctatum; *Oculi* magni, valde prominuli; *Palpi* æquales, longiores; *Antennæ* nigrae, longitudine thoracis, basi tenuissimæ, interdum flavicantes: quatuor ultimis, articulis crassioribus.

THORAX niger, cylindricus, subtilissime punctatus, capite & elytris, præsertim postice angustior.

STERNUM nigrum.

ELYTRA breviora, nigra, postice retusa, subtilissime punctata.

ABDOMEN nigrum, cylindricum, longitudine dimidii corporis.

PEDES nigri, interdum flavi, geniculis modo nigris; rarius flavi, immaculati.

Locus: Habitat frequens in littoribus.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 221. N:o 21. *St. Clavicornis*.

GEOFFR. *Hist. des Inf.* T. 1. p. 371. N:o 24.
Var. α. St. Juno.

VAR. β.

 VAR. β .

*Niger oculis prominulis, antennis clavatis,
elytris puncto flavo.*

Locus: Hab. in littoribus cum præcedente,
sed minus frequens.

OBSERV. *Fabrica & Statura omnino præcedentis,
ut secundum observationem ill. GEOFF-
ROY non distingui queant; cumque
& majores & minores utriusque va-
rietatis occurrant, punctum flavum non
esse differentiam sexualem credo, ut
GEOFFROY conjicit.*

STNON. FABR. *Mant. Inf. p. 221. N:o 20. St. Bi-
guttatus.*

LINN. *Syst. Nat. 2. p. 685. N:o 16. Faun. Sv.
N:o 847. St. Bipustulatus.*

GEOFFR. *Hist. des Inf. T. 1. p. 371. N:o 24.
Var. β . St. Juno.*

N:o XXVI.

STAPHYLINUS ORBICULATUS.

*Niger, thorace convexo, orbiculato,
antennis, palpis pedibusque fu-
sco-rufescentibus.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, supra infraque conve-
xum, orbiculatum, thorace la-
tius; *Antennae* filiformes, vix
capitis thoracisque longitudine;
Palpi fusco-rufescentes.

THORAX niger, orbiculatus, convexus,
capite elytrisque angustior, pro-
funda incisura ab illis disjunctus,
ut tenuissime illis adhæreat.

ELYTRA nigra, quadrata; thorace lon-
giora & latiora.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, vix thorace elytris-
que longius.

PEDES fusco-rufescentes.

Locus: Hab. rarius in Uplandia.

OBSERV. *Magnitudo St. Canaliculati, sed angustior.
Ab omnibus Staphylinis nigris optime
distinguitur thorace convexo, orbicula-
to, a capite majori valde disjuncto.*

N:o XXVII.

STAPHYLINUS ANGUSTATUS.

Linearis niger, thorace orbiculato convexo; palpis, antennis, elytris postice pedibusque flavo-rufis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace latius, supra infraque convexum; *Antennæ* filiformes breviores; *Palpi* flavo-rufescentes.

THORAX niger, convexus, rotundatus, postice attenuatus, capite elytrisque angustior, profundis incisuris ab iis disjunctus.

ELYTRA quadrata, thorace paulo longiora latioraque, antice nigra, postice rufo-flavescentia.

ALÆ albæ, hyalinæ, abdomine breviores.

ABDOMEN nigrum, dimidio corpore fere longius.

PEDES flavo-rufescentes.

LOCUS : Habitat in apricis Uplandiæ primo vere rarius; intra spicas fecalis, in horrea ad Hesselby inveci, semel plures inveni.

ORSERV. *Facies & statura præcedentis, sed duplo fere*

fere minor, & respectu latitudinis, angustior. Differt a St. Elongato, cui colore omnino affinis, magnitudine quadruplo minori, thorace rotundiori magis convexo, atque palpis omnibus æqualibus, filiformibus.

STAPHYLINUS GRACILIS.

Linearis rufus, elytris pedibusque pallidioribus, thorace rotundato, abdomine apice fusco.

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace latius, convexum, rufum; *Oculi* nigri; *Antennæ* filiformes, breviores.

THORAX rufus, convexus, rotundatus, postice attenuatus, capite elytrisque angustior, ab illis profunda incisura disjunctus.

ELYTRA testacea, quadrata, thorace paulo longiora & latiora.

STERNUM rufum.

ABDOMEN rufum, apice fuscum, dimidio corpore fere longius.

PEDES flavescentes.

Locus: Hab. in Uplandia rarius; intra segetem horreis ad Hesselby illatam semel magnam ejus copiam inveni.

OBSERV. *Statura, magnitudo & fabrica præcedentis, ut forsan mera varietates ejusdem speciei sint. Ut observavi, etiam mixti occurrunt, sed color omnino differt.*

N:o XXIX.

STAPHYLINUS SANGVINEUS.

Niger, elytris sanguineis, abdomine gibbo, antennis longioribus.

DESCRIPTIO.

CAPUT thoracis latitudine, nigrum, rugosum; *Oculi* parum prominuli; *Palpi* flavescentes; *Antennæ* fuscae, extrorsum crassiores, longitudine fere totius corporis.

THORAX niger, gibbus, rugosus, abdomine multo angustior.

STERNUM nigrum.

ELYTRA læte sanguinea, convexa, subrotundata, basi striata.

ABDOMEN nigrum, maxime gibbum, brevissimum, unde singularis facies.

PEDES: *Femora* fusca; *Tibiæ & Tarsi* flavescentes.

Locus: Hab. rarissime ad Upsaliam; e Germania a Dom. SCHNEIDER, & e Gallia a Dom. D'ANTIC mihi misfus.

OBSERV. *Magnitudo: minor; vix magn. Staph. sulcati, quo magis gibbus est. Descriptio LINNÆANA ambigua, unde etiam plures. Entomologi St. fulgidum, aut nitidum pro St. sanguineo LINN. habuerunt, sed omnino falsum.*

Synon. LINN. *Syst. Nat.* p. 689. N:o 19. *Faun. Svec.* N:o 853. *St. Sanguineus.*

FAMILIA SECUNDA

Capite thorace angustiore.

N:o xxx.

STAPHYLINUS NITIDUS.

Ater nitidus, elytris rufis, alis nigris.

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace paulo angustius, nigrum, nitidum, subtilissime punctatum: *Nucha* glabra; *Antenna* filiformes, capite thoraceque paulo longiores; *Oculi* albi, medio nigri.

THORAX niger, longitudine elytrorum, antice compresus, angulis acutis; postice rotundatus, subtilissime punctatus.

ELYTRA rufa, longitudine thoracis.

STERNUM nigrum.

ALÆ fulcescentes, apice obscuriores.

PEDES nigri; rarius obscure brunnei.

LOCUS: Hab. in fimetis parcius.

OBSERV. *Variat interdum elytris obscure rufis & thorace punctis ravioribus. Numerus punctorum excavatorum thoracis in hac & tribus sequentibus speciebus nimis*
va-

variat: interdum disco thoracis fere glabro inveniuntur. Minus igitur accurate ill. a LINNÉ characterem essentialem St. politi statuit in thorace punctis decem excavatis, ut etiam ill. GEOFFROY antea observavit.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 220. N:o 13. *St. Nitidus.*

STAPHYLINUS POLITUS.

*Ater nitidus, capite, thorace elytris-
que æneis, alis nigris.*

DESCRIPTIO.

CAPUT æneum, thorace angustius, rotundatum, convexum, margine punctatum; *Antennæ* filiformes, capite thoraceque paulo longiores; *Oculi* albi medio nigri.

THORAX æneus, punctatus, antice truncatus, angulatus, postice rotundatus.

ELYTRA ænea, thoracis longitudine, sed paulo latiora.

ALÆ fuscæ, apice obscuriores, corpore longiores: macula magna marginali nigra.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, longitudine dimidii corporis.

PEDES nigri.

LOCUS: Hab. frequens in stercore.

OBSERV. *Color æneus interdum magis obscurus est
& caput vix thorace angustius.*

STNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 220. N:o II. *St. Politus.*

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 683. N:o 5. *Faun. Svec.*
N:o 843. *St. Politus.*

DE GEER *Inf. T.* 4. p. 23. N:o 9. *St. Æneus.*

VAR. β.

VAR. β .

Totus niger nitidus, alis nigris.

Simillimus præcedenti; alis longis nigris optime a reliquis Staphylinis nigris hujus familiæ distingvitur.

Locus: Hab. in stercore rarius.

STAPHYLINUS MARGINATUS.

Niger nitidus, thoracis lateribus femoribusque flavis, alis nigris.

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace angustius, convexum, nigrum, margine punctatum; *Antennæ* capite thoraceque longiores nigræ; primo articulo subtus flavo; *Palpi* flavi; *Oculi* albi medio nigri.

THORAX niger, punctatus, lateribus flavis; antice angustatus, truncatus, postice rotundatus.

ELYTRA nigro-fuscescentia, thorace latiora.

ALÆ fuscae, apice obscuriores: macula marginali nigra.

PEDES; *Femora* flava; *Tibiæ & Tarsi* fuscescentes,

Locus: Habitat in fimetis parcius.

OBSERV. *Statura, magnitudine, & habitu St. nitidus, politus & marginatus ita conveniunt, ut vix nisi colore distingui possint; forsan. merae sunt varietates; sed cum in copulis juncti nondum observati sint, adhuc sub judice lis est.*

SYNON. *FABR. Mant. Inf. p. 221. N:o 1. St. Marginatus,*

N:o XXXIII.

STAPHYLINUS VARIANS.

Niger nitidus, thorace punctulato, immarginato, alis albis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace angustius, convexum, rotundatum, punctulatum; *Oculi* nigri margine albicantes; *Antennæ* filiformes, capite thoraceque paulo longiores.

THORAX niger, nitidus, convexus, punctatus, immarginatus: lateribus compressis; antice angustatus, angulatus, postice rotundatus.

ELYTRA nigra, thoracis longitudine.

STERNUM nigrum.

ALÆ amplæ, albo-hyalinæ: macula minuta marginali subfusca.

ABDOMEN nigrum, obtusum, longitudine dimidii corporis.

PEDES nigri.

LOCUS: Habitat frequens in stercore.

OBSERV. *Ab auctoribus cum St. Polito confusus videtur, sed omnino differt alis albis & magnitudine duplo minore.*

VAR.

VAR. β .

Niger nitidus, elytris puncto obsoleto rubro, femoribus anterioribus interdum basi rufis.

LOCUS: Habitat cum præcedenti, sed minus frequens.

OBSERV. *An sit Staph. biguttatus LINNÆI, ob ejus descriptionis ambiguitatem difficile est probatu; minime vero ejus St. bipustulatus esse potest, quia nec valde oblongus, nec antennæ clavatæ sunt, quæ notæ in var. β . St. Junonis optime quadrant.*

VAR. γ .

Niger, pedibus rufo-flavescentibus.

LOCUS: Habitat in Uplandia.

VAR. δ .

Niger, pedibus rufo-flavescentibus, elytris piceis.

LOCUS: Habitat cum præcedentibus parcius.

OBSERV. *Varietates α , β , γ fabrica & statura omnino similes, at var. γ præcedentibus paulo minor, & var. δ duplo fere illis minor, capite majori, latitudine fere thoracis, ut forsan species distincta sit, quamvis statura & habitu cum præcedentibus ita conveniat, ut probe illum Staphylinum distinguere baud valuerim.*

N:o XXXIV.

STAPHYLINUS ANALIS.

*Niger nitidus, elytris, ano pedibus-
que rufo-flavescentibus.*

DESCRIPTIO.

CAPUT minutum, nigrum, nitidum, thorace dimidio angustius; *Antennæ* subfiliformes nigræ, basi apiceque rufo-flavæ, dimidio fere corporis longitudine.

THORAX niger, nitidus, immarginatus; antice angustatus angulis obtusis; postice rotundatus.

STERNUM nigrum, nitidum.

ELYTRA rufo-flava, glabra, capitis thoracisque longitudine, thoracis latitudine.

PEDES rufo-flavi.

LOCUS: Hab. in fimetis.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 221. N:o 19. St. Analis.*

VAR. β .

Niger nitidus, elytris, thorace, ano pedibusque rufo-flavis.

LOCUS: Habitat cum præcedente.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 221. N:o 25. St. Merdarius.*

OB-

*OBSERV. Var. α paulo minor, sed me iudice bine
sejungi non meretur.*

VAR. γ .

Niger nitidus, ano pedibusque rufo-flavescentibus, elytris rufis: angulo exterioriore posteriore nigro.

Locus: Habitat apud nos rarissime, nec nisi unicum vidi.

OBSERV. Statura omnino var. α , at paulo minor.

N:o xxxv.

STAPHYLINUS ATRICAPILLUS.

*Rufus, capite, ano, sterno elytrisque
medio nigris.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum, elongatum,
vix dimidii thoracis latitudine;
Palpi rufi; *Antenna* extrorsum
crassiores, capitis thoracisque
longitudine, nigræ, basi apice-
que rufæ.

THORAX rufus, nitidus, immarginatus,
antice angustatus.

ELYTRA thorace longiora latioraque, ni-
gra, nitida: macula magna ba-
seos in angulo exteriore, mar-
gineque postico testaceo.

STERNUM nigrum, nitidum.

ALÆ amplæ, corpore longiores, al-
bo-hyalinæ.

ABDOMEN rufum, postice attenuatum; se-
gmentis duobus ultimis nigris.

PEDES longiores, rufo-flavi.

LOCUS: Habitat Upsaliæ in boletis rarior.

OBSERV. *Magnitudo & statura omnino var. β. St.
Analis, sed differt longitudine capitis
& colore.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 221. N:o 26. St. Atri-
capillus.*

N:o xxxvi.

STAPHYLINUS COLLARIS.

*Rufo-flavus, capite, sterno, ano ely-
trisque nigris.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace angustius, nigrum, nitidum; *Antennæ* pilosæ, nigrae apice flavicantes, extrorsum crassiores, capite thoraceque paulo longiores.

THORAX brevior, rufo-flavus, nitidus, subtilissime punctatus.

ELYTRA breviora, vix thorace longiora, nigra, nitida, subtilissime punctata.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN dimidio corpore longius, marginatum, rufum, ano nigro.

PEDES flavi.

LOCUS: Habitat apud nos rarissime, nec nisi unicum sub lapide, tempore vernali in Olunda Uplandiæ inveni.

OBSERV. *Similis St. ripario, sed dimidio minor, nec elytra sunt violacea, nec genicula nigra.*

SRNON. SCHÆFF. *Inf. p.* . t.

N:o XXXVII.

STAPHYLINUS TRICORNIS.

*Niger, capite thoraceque cornuto, ely-
tris rubris: margine interiore
& exteriori nigro.*

DESCRIPTIO MARIS:

CAPUT thorace angustius, nigrum, de-
pressum: cornibus duobus por-
rectis, longitudine dimidii capi-
tis; *Antennae* extrorsum cras-
siores, capitis thoracisque lon-
gitudine.

THORAX niger, punctatus, convexus,
submarginatus; postice rotunda-
tus, antice retusus: cornu va-
lido, porrecto, longitudine
thoracis.

ELYTRA subquadrata, thorace, cornu ex-
cepto, paulo longiora, rubra,
margine interiore & anteriore
nigro.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, marginatum, vix dimi-
dii corporis longitudine.

PEDES: *Femora* nigra; *Tibiae* & *Tarsi*
fuscescentes.

FOEMINA mari simillima, sed thorace mu-
tico

tico cornibusque capitis minoribus.

Locus: Rarissime obvi-
us: a Dom. QUENT-
ZEL in stercore bovino ad Scano-
ram Scaniæ lectus; a Dom. GED-
NER in plateis Caroli-Coronæ, tem-
pore vernali.

SYNON. HERBST *St. Tricornis.*

N:o XXXVIII.
STAPHYLINUS FUSCIPES.

Niger, elytris brevissimis pedibusque fuscis, thorace gibbo.

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace angustius, minutum, nigrum; *Antennæ* extrorsum crassiores, capitis thoracisque longitudine.

THORAX niger, gibbus, longitudine latior; postice rotundatus.

ELYTRA thorace breviora, depressa, fusca, certo situ rufescentia: margine interiore postice rotundato.

ALÆ albæ, apice, præsertim margine exteriori nigrescentes.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, obtusum, latitudine elytrorum, reliquo corpore fere duplo longius, dorso depresso, marginato; subtus convexum.

PEDES fusci.

LOCUS: Habitat rarius in fimetis; inter olera putrida cellis subterraneis ejecta, semel copiose a me repertus.

OBSERV. *Magnitudo: longitudine præcedentis, sed multo latior. Descriptiones auctorum ancipites, sed Pr. FABRICIUS me literis certiore fecit banc speciem suam esse St. fuscipidem.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 221. N:o 22. St. Fuscipes.*

LINN. *Syst. Nat. 2. p. 685. N:o 23. Faun. Sv. N:o 857.*

E

N:o XXXIX.

N:o XXXIX.

STAPHYLINUS LIMBATUS.

Niger, elytris brevissimis: margine pedibusque rufescentibus.

DESCRIPTIO.

- CAPUT** thorace angustius, nigrum; *Antennæ* capite thoraceque paulo longiores, basi apiceque rufescentes, extrorsum crassiores: primo ultimoque articulo reliquis longioribus.
- THORAX** fusco-nigrescens, nitidus, convexus, longitudine latior; antice angulatus, postice rotundatus.
- STERNUM** rufescens.
- ELYTRA** nigra, margine, præsertim anteriore rufo-fuscescente, seu rufo-fuscescentia: macula magna subquadrata nigra.
- ALÆ** albæ: macula marginali nigra.
- ABDOMEN** reliquo corpore longius: dorso nigro, plano, marginato; subtus convexum, rufescens.
- PEDES** rufi.

VAR. β .

Niger, elytris brevissimis: margine pedibusque rufescentibus; thorace postice medio canaliculato.

Locus: Habitat in putridis & ligno antiquo rarius.

OB-

OBSERV. *Paulo minor præcedenti, cui simillimus, forsan mas, Statura fuscipedis, at minor & thorace minus gibbo. Var. β. a St. Canaliculato differt colore, capite angustiore, & thorace minus rotundato, magis gibbo.*

SYNON. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 585. N:o 17. Faun. Svec. N:o 848. St. Lignorum? sed descriptio minus bene quadrat.*

FABR. *Mant. Inf. p. 221. N:o 27. St. Marginellus?*

STAPHYLINUS EMARGINATUS.

Rufo-fuscus, depressus, elytris pallidioribus brevissimis, thorace elytrisque emarginatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT rufo-fuscum, minutum, thorace multo angustius; *Antenna* dimidio corpore longiores, filiformes: ultimo articulo conico, reliquis longiore.

THORAX rufo-fuscus, longitudine latior, depressus, concavus, marginibus lateralibus elevatis; antice angustatus, truncatus, angulis obtusis; lateribus posticeque emarginatus, angulis acutis.

ELYTRA depressa, thorace pallidiora, vix thoracis longitudine, sed paulo latiora, postice emarginata: angulo exteriori acuto, interiore obtuso.

STERNUM fuscum.

ABDOMEN rufo-fuscum, longitudine dimidii corporis: dorso marginato, depresso, papilloso, ventre convexo.

PEDES rufo-fusci.

Lo-

LOCUS: Rarissime occurrit, nec nisi unicum
in boleto inveni; e Gallia mihi a
Dom. D'ANTIC misfus.

OBSERV. *Varietatem vidi huic simillimam, sed
thorace utrinque latere puncto impres-
so, forsan erat varietas sexus.*

STAPHYLINUS LUNULATUS.

*Rufo-testaceus, capite, elytris medio
abdomineque cingulo nigro.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace vix angustius;
Antennæ extrorsum crassiores,
capite thoraceque longiores, fu-
scescentes, basi apiceque rufo-
flavæ.

THORAX immarginatus, convexus, ro-
tundatus, rufo-flavus.

ELYTRA thoracis longitudine, sed paulo
latiora, nigro-fusca, antice la-
te, posticeque summo margine
rufo-flavo.

STERNUM rufo-flavum.

ABDOMEN reliquo corpore longius, rufo-
testaceum, versus apicem, non
tamen ano cingulo nigro: dorso
depresso, marginato.

PEDES rufo-testacei.

LOCUS: Hab. in boletis putridis, præsertim
autumno frequens.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 222. N:o 2. *Oxypo-
rus lunulatus.*

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 689. N:o 7. *Faun. Svec.*
N:o 845. *St. lunulatus.*

N:o XLII.

STAPHYLINUS MELANOCEPHALUS.

Testaceus, capite atro, thorace rotundato.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum, thorace paulo angustius; *Antennæ* testaceæ, extrorsum crassiores, capite thoraceque longiores.

THORAX testaceus, rotundatus, parum convexus.

ELYTRA testacea, thorace paulo longiora & latiora.

ALÆ albæ.

STERNUM rufo-testaceum.

ABDOMEN testaceum, longitudine vix dimidii corporis, versus apicem non tamen in ipso apice fuscescens: dorso depresso, marginato.

PEDES testacei.

LOCUS: Hab. in boletis Uplandiæ rarius.

OBSERV. *Statura & facies præcedentis, sed minor & elytra immaculata.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 222. N:o 37. St. melanocephalus.*

STAPHYLINUS SOCIALIS.

Niger, elytris depressis, pedibus fusco-rufescentibus.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum, thorace angustius; *Antennæ* fuscæ, extrorsum crassiores, capite thoraceque longiores.

THORAX niger, nitidus, immarginatus; postice rotundatus, longitudine fere latior.

STERNUM nigrum.

ELYTRA subquadrata, lævissima, vix thorace longiora, disco fusco-rufescentia, margine obsolete nigro.

ALÆ amplæ, albo-hyalinæ.

ABDOMEN nigrum, depressum, dorso marginatum, dimidio corpore longius.

PEDES rufo-fuscescentes, rarius pallidi.

OBSERV. *Magnitudo St. Melanocephali.*

VAR, β .

Niger, elytris depressis fuscis, vix rufescentibus, pedibus pallidioribus.

Similis omnino præcedenti, sed sæpius dimidio minor, forsan mas.

Lo-

LOCUS: In succo betulæ, tempore hyemis excisæ, ad Hesselby magnam ejus copiam reperi, mense Majo.

OBSERV. *Difficillima est minimorum Staphylinorum dignoscendi & describendi ratio, & forsân ideo plane ab auctoribus omisi sunt. Staphylinus socialis statura aliquo modo est St. fuscipidis, & elytra ejus rufescentia in var. α aliam similitudinem præbent, sed sexies minor est etiam illa varietas α , nec thorax gibbus, nec alæ apice fuscescentes. Differt varietas β a St. bicolori, quod ex altera familia & sæpius sexies minor sit.*

N:o XLIV.

STAPHYLINUS BOLETI.

Linearis rufo-fuscus, antennis pedibusque rufo-pallidis.

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace latius, rufo-fuscum; *Antennæ* rufo-flavæ, extrorsum crassiores, longitudine capitis thoracisque; *Oculi* parvi, prominentes, nigri.

THORAX subrotundatus, convexus, rufo-fuscus.

STERNUM rufo-fuscum.

ELYTRA rufo-fusca, subconvexa, longitudine & latitudine thoracis.

ABDOMEN latitudine elytrorum rufo-fuscum, apice magis nigrescente, reliquo corpore longius: dorso depresso, marginato.

PEDES pallide rufi.

LOCUS: Habitat in boletis.

OBSERV. *Magnitudo: longitudine fere var. α præcedentis, sed multo angustior. Unicum vidi elytris reliquo corpore paulo pallidioribus, ut LINNÆUS banc speciem describit, sed character ille minime constans, ut etiam ill. DE GEER ante me observavit. Differt a St. Sociali, elytrorum convexitate, oculis magis prominentibus, & quod magis elongatus sit.*

SYNON. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 686. N:o 26. *Faun. Svec.* N:o 859. *St. Boleti.*

DE GEER *Hist. des Ins.* 4. p. 26. N:o 13.

N:o XLV.

N:o XLV.

STAPHYLINUS BRUNNEUS.

*Rufo-brunneus, capite, elytris postice
abdomineque apice nigris.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace angustius; *Oculi* prominuli; *Antennæ* rufo-brunneæ, extrorsum crassiores, capituli thoracisque longitudine.

THORAX rufo-brunneus, longitudine latior, subtilissime punctatus, submarginatus; antice rotundatus, postice fere truncatus.

ELYTRA longitudine fere capitis thoracisque, subtilissime striato-punctata; apice rotundata, antice ultra dimidiam partem rufo-brunnea, postice nigra.

SCUTELLUM nullum.

STERNUM brunneum.

ABDOMEN longitudine capitis thoracisque, basi rufo-brunneum, apice nigrum.

PEDES rufi.

LOCUS: Hab. in Uplandia rarior.

OBSERV. Magnitudine & statura est *St. Caraboidis*, sed differt colore, capite minori, & antennis brevioribus.

VAR.

VAR. β .

*Rufo-brunneus, capite, abdominis apice, ely-
tris postice margineque interiore
late nigris.*

Statura & fabrica omnino præceden-
tis, at duplo fere minor, forsan mas.

Locus: Hab. cum præcedenti rarius.

N:o XLVI.

STAPHYLINUS RIVULARIS.

*Niger, elytris longioribus abdomineque
depressis, thorace quadrisulcato:
antice rotundato, pedibus
rufo-brunneis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace angustius, depressum; *Oculi* prominuli; *Antennæ* extrorsum crassiores, vix capitis thoracisque longitudine, basi rufæ, apice nigræ.

THORAX niger, longitudine latior, quadrisulcatus: sulcis exterioribus marginalibus; antice rotundatus; postice truncatus; intra sulcos medios interdum antice sulculi minores.

STERNUM nigrum.

ELYTRA depressa, obscure picea, subtilissime punctata, capite thoraceque fere longiora.

ALÆ albæ, hyalinæ, absque ullo puncto marginali.

ABDOMEN obtusum, depressum, nigrum, vix capitis thoracisque longitudine.

PEDES rufo-brunnei.

Lo-

Locus: In succo betulæ excisæ, mense Majo ad Hesselby rarius reperi.

OBSERV. *Differt a St. Piceo cui affinis, quod ex altera familia, quod brevior, sed non angustior, quod magis depressus, quod abdomen multo brevius, & Thorax antice, non vero postice rotundatus sit.*

N:o XLVII.

STAPHYLINUS FLORALIS.

*Niger, depressus, thorace lævi, pedibus
piceis, alis albo-hyalinis: costa
ultra medium fuscescente.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace angustius; *Antennæ* fuscescentes, extrorsum crassiores, capitis thoracisque longitudine.

THORAX niger, lævis, submarginatus, longitudine latior; antice rotundatus, postice truncatus.

ELYTRA nigra, depressa, capitis thoracisque longitudine.

STERNUM nigrum.

ALÆ amplæ, corpore fere duplo longiores, albo-hyalinæ: costa ad medietatem fuscescente.

ABDOMEN depressum, obtusum, vix capite thoraceque longius.

PEDES picei, interdum rufescentes.

LOCUS: Habitat in floribus, præsertim padi sat frequens tempore vernali.

OBSERV. Magnitudine & statura omnino præcedentis, sed differt thorace glabro.

N:o XLVIII.

STAPHYLINUS TECTUS,

*Niger, latisfimus, elytris abdomen fere
obtegentibus, testaceo-fuscescenti-
bus, pedibus pallidioribus.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace angustius; *Oculi* prominuli, *Antennæ* nigrae, basi pallidiores, extrorsum crassiores, capite thoraceque longiores.

THORAX niger, summo margine testaceo-fuscescente, parum convexus, submarginatus, longitudine latior; antice posticæque truncatus: angulis obtusis.

STERNUM nigrum.

ELYTRA testaceo-fuscescentia, longissima, capite thoraceque longiora, abdomen fere obtegentia.

ALÆ amplæ, albo-hyalinæ.

ABDOMEN nigrum, obtusum: lateribus depressis, elytris vix longius, unde singularis facies.

PEDES pallide testacei, fuscescentes.

OBSERV. *Magnitudo: latitudine est St. Elongati, sed quadruplo brevior.*

VAR.

VAR. β .

Niger, elytris pedibusque fuscis.

LOCUS: In succo betulæ excisæ habitantem reperi ad Hesselby initio mensis Maji.

OBSERV. *Paulo major, at statura & habitus omnino idem. Latitudine, & abdomine brevissimo ab omnibus reliquis distinguitur.*

N:o XLIX.

STAPHYLINUS DEPRESSUS.

Niger depressus, capite thoraceque marginato, pedibus rufis, antennis basi binodibus.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace angustius, marginatum; *Oculi* parum prominuli; *Antennæ* longitudine capitis thoracisque: primis duobus articulis ultimoque reliquis crassioribus, globosis.

THORAX niger, longitudine latior, acute marginatus, subtilissime punctatus, antice posticeque truncatus: fulculo unico, minime profundo longitudinali.

STERNUM nigrum.

ELYTRA depressa, nigra, capitis thoracisque longitudine, subtilissime punctata.

ALÆ amplæ, albæ: costa basi fuscescente.

ABDOMEN nigrum, marginatum, capitis thoracisque longitudine, latitudine elytrorum.

PEDES rufi, interdum rufo-fuscescentes.

LOCUS: In succo betulæ excisæ, initio mensis Maji ad Hesselby habitantem reperi.

OBSERV. *Magnitudo: paulo præcedenti minor. Corpore depresso a St. Quentzeli, antennis basi binodibus a reliquis optime dignoscitur.*

N:o L.

N:o L.

STAPHYLINUS PORCATUS.

*Niger, thorace abdomineque porcato,
elytris quadrisulcatis, pedibus piceis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thorace angustius, nigrum.

THORAX niger, acute marginatus, in medio gibbus, porcatus; antice paulo angustatus, postice acute angulatus.

STERNUM nigrum.

ELYTRA nigra, longitudine capitis thoracisque, quadrisulcata.

ALÆ albæ: macula minuta marginali fusca.

ABDOMEN nigrum, capitis thoracisque longitudine, marginatum, dorso porcatum.

PEDES breviores, picei.

LOCUS: Habitat in Scania QUENTZEL; prope Upsaliam PRINTZ rarissime hunc deprehendit.

OBSERV. *Statura & magnitudo omnino præcedentis; inveniuntur etiam duplo minores, forsitan mares.*

STAPHYLINUS QUENTZELI.

Niger nitidus, antennis extrorsum crassioribus: basi binodibus; thorace gibbo elytrisque punctatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigro-fuscum, nitidum, thorace paulo angustius, punctatum; *Antennae* basi binodes: articulis tribus ultimis crassioribus.

THORAX nigro-fuscus, nitidus, longitudine latior, punctatus, gibbus, marginatus.

STERNUM nigrum,

ELYTRA nigro-fuscescentia, nitida, vix thorace longiora.

ABDOMEN nigrum, nitidum, longitudine dimidii corporis.

PEDES nigri.

LOCUS: E Scania mihi misit Dom. QUENTZEL indefessus & oculatissimus insectorum observator.

OBSERV. *Longitudo St. porcati, sed angustior. Antennis basi binodibus a reliquis St. nigris distinguitur; a St. depresso, quod angustior, quod thorax gibbus, & quod tres ultimi antennarum articuli increasati sint.*

N:º LII.

STAPHYLINUS SUBTERRANEUS.

Niger glaber, nitidus, elytris longioribus extrorsum rufo-flavis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace duplo angustius; *Antennæ* filiformes, apice fuscescentes, longitudine fere dimidii corporis.

THORAX niger, convexus, submarginatus, longitudine latior, antice posticeque truncatus, capite elytrisque arcte junctus.

STERNUM nigrum.

ELYTRA capite thoraceque longiora, latitudine thoracis, antice posticeque truncata, acute angulata, nigra: macula magna rufo-flava in angulo anteriore exteriore.

ALÆ corpore longiores, fusco-hyalinæ, macula marginali nigra.

ABDOMEN nigrum, postice attenuatum, pilis longioribus, longitudine capitis thoracisque: annulo penultimo reliquis duplo longiore.

PEDES: *Femora & Tibiæ* nigra; *Tarsi* fuscescentes.

LOCUS: Ab. III. A LINNÉ in cellis subterraneis
sæpius habitare fertur, at mihi nun-
quam obvius fuit, nisi in succo be-
tulæ excisæ, in medio mensis Maji.

OBSERV. *Magnitudo & statura omnino sequentis.*

SYNON. LINN. *Syst. Nat. 2. p. 684. N:o 12. Faun.*
Svec. N:o 849.

N:o LIII.

STAPHYLINUS RUFIPES.

Niger glaber, elytris longioribus, pedibus rufis, penultimo segmento abdominis reliquis duplo longiore.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, glabrum, thorace duplo angustius; *Antennæ* vix extrorsum crassiores, fuscæ, basi rufescentes, longitudine dimidii corporis.

THORAX niger, glaber, convexus, submarginatus, longitudine latior, antice posticeque truncatus, capite elytrisque arcte junctus.

STERNUM nigrum.

ELYTRA ampla, capite thoraceque longiora, latitudine thoracis, antice posticeque truncata.

ALÆ albo-hyalinæ, corpore fere duplo longiores: macula marginali fusca.

ABDOMEN nigrum, postice attenuatum, pilosum, thorace vix longius: anulo penultimo reliquis duplo longiore.

PEDES rufi testacei.

Locus: Hab. in stercore frequens.

F 4

Srn-

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 222. N:o 31. *St. Rufipes*.
 LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 685. N:o 24. *Faun. Sv.*
 N:o 825. *St. Rufipes*.
 DE GEER *Hist. des Inf.* t. 4. p. 24. N:o 11.

VAR. β .

*Niger, summo margine postico elytrorum
 pedibusque rufis.*

LOCUS: Hab. cum præcedente.

OBSERV. *Statura & summa similitudo præcedentis,
 quo dublo minor est, at vix distingui
 meretur. Quis hic esset diu hæsi, donec
 FABRICIUS litteris suis dubia mea
 exemerit. Minus accurate igitur hic
 summus auctor illi staturam St. margi-
 nati in Syst. Ent. p. 266 tribuit; ill. ve-
 ro a LINNÉ eum similem esse St. sub-
 terraneo, sed minorem; in Faun. Sv.
 apposite affert.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 221. N:o 16. *St. Flavescens*.
 LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 684. N:o 13. *Faun. Sv.*
 N:o 850. *St. Flavescens*.

VAR. γ .

*Niger, thoracis lateribus elytrisque palli-
 dioribus, pedibus rufis.*

LOCUS: Habitat cum præcedentibus.

OBSERV. *Statura & habitus omnino præcedentium
 & magnitudo varietatis α .*

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 221. N:o 23. *St. Hypno-
 rum an? sed minime statura St. fuscipedis,
 ut in Syst. Ent. p. 266, forsan perperam pro
 rufipedis, impressum est.*

N:o LIV.

N:o LIV.

STAPHYLINUS DISPAR.

Niger, thorace, elytris pedibusque rufo-flavis; elytris longioribus, penultimo segmento abdominis reliquis vix longiore.

DESCRIPTIO.

- CAPUT** nigrum, nitidum, convexum, thorace duplo angustius; *Antennæ* filiformes, rufo-flavæ, apice fuscescentes, longitudine dimidii corporis.
- THORAX** convexus, supra infraque rufo-flavus, immarginatus, longitudine latior, antice posticeque truncatus, capite arcte junctus.
- ELYTRA** flava, summo margine anteriore & exteriori basi nigra, thorace paulo latiora, capitis thoracisque longitudine.
- STERNUM** nigrum.
- ALÆ** albæ, hyalinæ, corpore longiores: macula marginali pallida.
- ABDOMEN** nigrum, interdum paulo rufescens, apice attenuatum, pilosum.
- PEDES** rufo-flavi.

Locus: Hab. in fimetis & sub foliis putridis frequens.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 221. N:o 28. *St. Chrysomelinus*.

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 685. N:o 21. *Faun. Sv.* N:o 855. *St. Chrysomelinus*.

VAR. β.

Niger, thoracis marginibus flavescentibus, elytris rufo-flavis: margine exterioriore nigro.

Locus: Hab. cum præcedenti rarius.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 221. N:o 24. *St. Nitidulus*.

VAR. γ.

Rufo-flavus, oculis, sterno, ano elytrisque antice nigris.

Locus: Habitat in fimetis frequens.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 221. N:o 17. *St. Obtusus*.

LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 684. N:o 9. *St. Obtusus*.

VAR. δ.

Niger, thorace toto elytrisque postice rufescentibus.

Locus: Habitat cum præcedentibus.

VAR. ε.

Totus rufo-flavus, capite nigro.

Locus: Habitat cum præcedentibus minus frequens.

VAR.

VAR. ζ.

Niger, thoracis lateribus pedibusque flavo-lividis, elytris flavo-lividis: margine exteriori maculaque magna longitudinali nigra.

LOCUS; Habitat in stercore rarius.

OBSERV. Magnitudine, fabrica & statura, omnium harum varietatum ita summa est similitudo, ut contra plurium auctorum sententiam omnes in unam speciem conjungere ausus sim; & fateor me, si distinguere debent, nullos characteres distinctos, coloribus exceptis, statuere posse. Omnes vero entomologi attenti facile observare possunt colores hac in specie ita misceri & variare, ut vix duo individua exacte similia reperiantur. Vidi etiam ipse Varietatem α & γ copulis junctam. Statura & fabrica est *St. Rufipedis*, sed differt magnitudine quadruplo minore, & penultimo segmento abdominis reliquis non duplo longiore.

STNON. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 684. *St. Silphoides*.

STAPHYLINUS LITTOREUS.

*Niger, antennis, thoracis lateribus,
elytris disco pedibusque testaceis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum, thorace angustius; *Antennæ* testaceæ, extrorsum crassiores, capite thoraceque longiores.

THORAX niger, lateribus late testaceis, convexus, immarginatus.

STERNUM nigrum, nitidum.

ELYTRA thorace paulo latiora, capitis thoracisque longitudine, nigra: disco testaceo; seu testacea: margine exteriori & angulo exteriori posteriore nigro.

ABDOMEN nigro-fuscum, apice attenuatum, pilosum.

PEDES longiores, testacei.

Locus: Habitat in arena humida riparia, sub qua cuniculos facit, præsertim in Gottlandia a LINNÉ. Nunquam ipse illum vivum vidi.

OBSERV. *Magnitudo, fabrica & statura omnino præcedentis, ut nisi oeconomia ejus, te-*

*testante ill. a LINNÉ omnino differret,
vix ratio adesset cur ab eo distin-
gueretur.*

SrNON. LINN. *Syst. Nat.* 2. p. 685. N:o 18. *Faun.*
Su. N:o 852. *St. Littoreus.*



EMENDANDA.

Pag. 23. l. 23. An *leg.* Quis

Pag. 26. l. 3. *coeruleis*, femoribusque *leg.* *coeruleis*, thorace femoribusque

Pag. 27. l. 27. SCHÆFF. Icon. T. 71. fig. 3 *deleatur.*


Pag. 39. l. 26. *plures.* Entomologi *leg.* *plures* entomologi

Pag. 50. l. 26. Inf. p. . t. *leg.* Icon. Tab. 71. f. 3.

Cetera leviora b. L. ipse corrigat.


MONOGRAPHIA
CARABORUM
SVEGICÆ

A
GUSTAVO DE PAYKULL.



UPSALIÆ,

LITTERIS DIRECT. JOHANN. EDMAN, MDCCXG.



LECTORI.

Si in speciebus Generis Staphylini determinandis perobscuras auctorum descriptiones querendi mihi ratio fuerit, potiori jure eandem obtinere autumaverim in Caraborum genere considerando, quod jam Entomologorum deferro examini. E re certe fuisset, ut numerosæ in illo occurrentes species & varietates præ multis aliis Insectorum familiis, sub accuratiorem quæstionem curiose revocarentur. Quippe cum Characteres specifici ex coloribus solis, iisdemque interdum haud probe observatis sæpe petuntur, non mirum est, si ita tricis involuta sit cognitio earum, ut ex illis nulla certa synonymia expediri potuerit. Jam in eandem descriptionem plures quadrant species, jam in unam collatæ, jam denique in plures disjunctæ exstant. Frequenter hæc occurrit in Carabis confusio, nec unquam

evitabilis est, nisi Entomologi, una cum colorum differentiis, essentielles Insectorum partes, huc usque solito sollicitius respiciant.

In amplioribus generibus ad certam quandam speciem expeditius inveniendam egregie conferunt idoneæ subdivisiones: nec tales subministrandas omiserunt auctores, sed tamen interdum, quod fatendum est, minus rei æcommodatas; quarum argumenta ut exhibeamus, ultra Carabi genus progredi haud nobis opus est.

In MAJORES & MINORES illud dispescuerunt Ill. a LINNÉ atque FABRICIUS. Salva tantorum nominum reverentia dixerim hoc factum nimis properato consilio esse imputandum, præsertim cum mensuram plurium variantium specierum determinare non detur. Sic e. g. *Carabus trilineatus*, qui
ma-

majoribus a FABRICIO accensetur, Carabæ ruficorni, aliisque multo minor sæpenumero reperitur, quos supra laudatus Auctor inter minores recenset.

Omnis proinde subdivisio, quæ a quarundam corporis partium dissimilitudine essentiali, vel earundem defectu non desumitur incompleta evadit; cui conclusioni innixus adstruxi meas dispartiendi methodos.

Caraborum quidam alis instruuntur, quidam iisdem carent. Nemo mihi obiciat species hac in parte variare, adeo ut exempli gratia alter sexus alatus conspiceretur, alter vero apterus. Ea inter multa individua, quæ considerandi non solum mihi anxia fuit, sed etiam anatomice inquirendi, nunquam alterum sexum alis præditum, alterum ipsis destitutum inveni. E contrario in hoc genere sexus sibi invicem ma-

gis similes notavi, quam in plerisque aliis: cumque talis discrepantia nec ullibi ab Entomologis observata sit, hoc in momento nulla dubitatio diutius obtinere debet, quin hæc divisio genuina sit. Si Carabus quidam e. g. *Leucophthalmus* ab Entomologis jam alatus jam apterus sit descriptus, hic eorum disensus exinde est derivandus, (quod spero me evidenter probaturum,) quod plures species in unam sint commixtæ, quas inter quædam apteræ, quædam alatæ fuerunt.

Propterea, III. DE GEERII secutus sententiam, non dubitavi Carabos in duas Familias primarias partiri, scilicet in APTEROS & ALATOS. Eorum vero tantus est numerus, ut utraque familia ulteriori indigeat partitione. Apteriorum quidam thoracem habent postice emarginatum, quidam transverse truncatum: sic eos divisi in

APTE-

APTEROS *thorace postice emarginato*, & APTEROS, *thorace truncato*. Inter alatos autem alii habent thoracem obcordatum antice latissimum, alii eundem minus magisque rotundatum, in medio latissimum; alii thorace elongato sunt notabiles, atque alii denique subquadrato, five a basi ad apicem ferè undique æquali, & elytrorum latitudine. Secundam igitur Familiam, prima triplo majorem, in quatuor subdivisiones distribui, nimirum in ALATOS *thorace obcordato*; *thorace semirobundato*; *thorace elongato*; & *thorace subquadrato*.

Posset itidem in Carabi Ovati gratiam adhuc una adponi dispartitio, videlicet ALATI *thorace postice latiori*; alias vero huiusmodi species ignorans, donec plures similes detegantur, ad quartam Sectionem hunc Carabum retuli.

*Dab. in Prædio Hesselby, prope
Upsaliam die 4 Julii 1790.*

CARABUS.

ANTENNÆ filiformes.

PALPI sex inæquales: articulo ultimo obtuso truncato,

LABIUM integrum.

TARSI quinquearticulati,



FAMILIA PRIMA:

APTERI.

SECTIO PRIMA;

Thorace postice emarginato.

N:o I.

CARABUS CORIACEUS.

Niger elytris opacis: punctis intricatis subrugosis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, erosum; *Maxillæ* longiores, denticulatæ; *Antennæ* apice fuscæcentes.

THORAX niger, opacus, lineola longitudinali punctisque lævioribus, obcordatus, antice truncatus, postice emarginatus.

A 5

ELY-

ELYTRA nigra, opaca, convexa, thorace multo latiora: punctis intricatis subrugosis.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, convexum, nitidum.

PEDES longiores, nigri, nitidi; *Femora* anteriora subclavata; *Tibiae* omnes apice bispinosae.

LOCUS: hab. in putridis & sub lapidibus Scandinæ rarius.

OBSERV. *Magnitudine omnes Sueciæ Carabos superat.*

SYNON. FABRICII MANT. *Inf. t. i. p. 195. N:o 3. Car. Coriaceus.*

LINN. *Syst. Nat. II. p. 668. N:o 1. Car. Coriaceus.*

DE GEER *Inf. t. 4. p. 90. N:o 4. Car. Coriaceus.*

SCHÆFF. *Icon. Inf. t. XXXVI, f. I. mas. t. CXLI f. 1. fem.*

N:o II.

CARABUS CYANEUS.

Niger, capite thoraceque violaceis, elytris violaceis: punctis intricatis subrugosis.

DESCRIPTIO:

CAPUT erosum, postice violaceum, antice

tice nigrum: *Maxillæ Palpique* nigri; *Oculi* albicantes; *Antennæ* fuscæ.

THORAX violaceus, nitidus, subtus magis niger, obcordatus, marginatus, planus, canaliculatus, subrugosus, longitudine latitudinis.

ELYTRA postice latiora, violacea, nitida: punctis elevatis, elongatis, intricatis, plurimis rugosis nigris.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

P E D E S longiores, nigri, nitidi.

LOCUS: Hab. in Svecia australi rarissime, in Germania magis frequens.

OBSERV. Differt a *Carabo Coriaceo*, colore, magnitudine & thorace magis plano, canaliculato; a *Carabo Purpurascens* & *Violaceo* differt thorace longiore & elytris rugosis, totis, non vero solo margine, violaceis.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 195. N:o 7. *Car. Cyaneus*.

LINN. *Faun. Sv.* N:o 780. *Car. Intricatus*.

N:o III.

CARABUS VIOLACEUS.

Niger, thoracis elytrorumque marginibus violaceis, elytris subpunctatis lævibus.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; *Antennæ* basi nigræ, apice fuscescentes.

THORAX niger, margine violaceo, nitido, obcordatus, longitudine latior, subtilissime punctatus, marginatus, lineola longitudinali, antice truncatus, postice emarginatus.

ELYTRA convexa, nigra, subtilissime, confertissime sine ordine punctata, (minime striata;) margine violaceo purpurascente nitido; subtus griseo-flavescentia punctis confertissimis.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

P E D E S longiores, nigri.

Locus: hab. in putridis & sub lapidibus.

OBSERV. *Minime alatus, ut Ill. A LINNÉ, & post illum Cel. Dom. FABRICIUS baud con-*
ue-

venienter descripserunt. Synonymon DE GEERIANUM, a FABRICIO ad hanc speciem relatum minime ad illum sed ad Car. Hortensem pertinet. Unicum individuum, e Gallia mihi missum elytris regulariter, non vero ut in sequenti rugose, punctato - striatis notatur, cetero huic simillimum est, an varietas? an Species distincta, vel hybrida e copula forte Car. Violacei & Purpurascensis orta.

SRNON. FABR. Mant. Inf. p. 195. N:o 5. Car. Violaceus.

LINN. Syst. Nat. II. p. 669. N:o 8. Faun. Sv. N:o 787. Car. Violaceus.

SCHÆFF. Icon. t. III. f. 1.

N:o IV.

CARABUS PURPURASCENS.

Niger thoracis elytrorumque marginibus violaceis, elytris rugose punctato-striatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; Antennae apice fuscescentes.

THORAX niger, margine acute elevato, violaceo, obcordatus, subpunctatus, longitudine latior, lineola longi-

gitudinali; dorso convexo postice retuso.

ELYTRA nigra, convexa, sedecimstriata, rugose punctata, margine violaceo purpurascente.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri, nitidi.

Locus: Habitat cum præcedenti frequentior.

OBSERV. Magnitudine & habitu præcedentis, sed differt elytris rugose punctato-striatis, thoraceque postice angustiore. Fæmina mari simillima, ideoque baud varietas sexus Car. Violacei.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 195. N:o 6, Car. Purpurascens.

SCHÆFF. Icon. Inf. LXXXVIII. f. 1.

N:o v.

CARABUS GLABRATUS.

Niger lævis, thorace latiore, elytris subtilissime punctatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; *Oculi Antennæque* apice fuscescentes.

THO-

THORAX niger, obcordatus, elytris vix angustior, convexus, marginatus, subtilissime punctatus; angulis posterioribus obtusis, minus quam in Carabo Purpurascente, prominentibus.

ELYTRA nigra, immaculata, convexa, lævis-
sima, subtilissime, confertissime punctata, margine concolore.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri.

MAGNIT. Carabi Violacei, vel paulo major.

Locus: Habitat in Finlandiæ & Dalecarliæ locis montosis.

OBSERV. Differt a Car. Violaceo, thorace latiore, margine thoracis elytrorumque unicolore.

N:o VI.

CARABUS GEMMATUS.

*Niger elytris striatis: punctis æneis
bilobis excavatis triplice serie,
margine subviolaceo.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, subrugosum; *Antennæ* apice fuscescentes. **THO-**

THORAX niger, margine subvirescente, obcordatus, parum convexus, lineola longitudinali, subtilissime punctatus, marginatus: angulis posticis obtusis, prominentibus.

ELYTRA nigra, convexa, striata, punctis æneis bilobis, triplice serie excavatis, margine subviolaceo.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

P E D E S nigri, nitidi.

MAGNIT. & **Statura** Carabi Violacei.

LOCUS: Habitat in putridis minus frequens.

SYNON. *FABR. Mant. Inf. p. 196. N:o 15. Car. Gemmatus.*

DE GEER. Inf. t. 4. p. 90. N:o 5. Car. Striatus. t. 3. f. 1.

N:o VII.

CARABUS HORTENSIS.

Niger, thorace latiore, elytris subrugosis, margine punctisque triplice serie excavatis æneis,

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *Oculi* pupillati; *Antennæ* apice fulcescentes. **THO-**

THORAX niger, convexus, lineola longitudinali, obcordatus, latitudine fere baseos elytrorum, margine parum prominulo æneo-purpurascente.

ELYTRA nigra, convexa margine subæneo, minime striata: rugis vix nudis oculis conspicuis, punctis æneis triplici ferie excavatis.

STERNUM nigrum; nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri, nitidi.

MAGNIT. Latitudine Carabi Violacei sed brevior, & statura Carabi Glabrati.

Locus: Habitat in putridis & sub lapidibus.

OBSERV. Differt a Carabo Gemmato, cui affinis, latitudine thoracis, & elytris baud striatis.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 196. N:o 16. Car. Hortensis.

LINN. Syst. Nat. 11. p. 668. N:o 3. Faun. Sv.
N:o 783. Car. Hortensis.

DE GEER Inf. t. 4. p. 89. N. 3. Car. Violaceus.

SCHÆFF. Icon. Inf. t. XI. f. 11. sed colore
nimis purpurascente picta.

CARABUS CLATHRATUS.

Niger, capite thoraceque subæneis, elytris æneo-virescentibus quadrisulcatis: punctis cupreis excavatis, interjectis longitudinalibus.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum *nucha* subænea; *Oculi* pupillati; *Antennæ* apice cinerascetes.

THORAX subæneus, convexus, marginatus, obcordatus, lineola longitudinali; vix postice emarginatus, in angulis vero posterioribus dorso profunde retusus.

ELYTRA æneo - subvirescentia, convexa: sulcis tribus latis longitudinalibus, in quibus puncta oblonga elevata concolora, & inter illos puncta magna excavata cuprea; In ipso margine exteriori sulculus minor punctaque minora, excavata.

STERNUM nigrum, nitidum.

PEDES nigri, nitidi.

MAGNIT. Carabum Violaceum æquiparat.

Lo-

Locus: Habitat in putridis, & sub lapidibus,
in pratis humidis tempore ver-
nali sat frequens.

OBSERV: Simillimus var. α, sed totus fere niger.

SYNON: FABR. Mant. Inf. p. 197. N:o 26. *Carabus*
Clathratus.

LINN. Syst. Nat. II. p. 669. N:o 5. Faun.-Su.
N:o 782. *Carabus Clathratus*.

DE GEER Inf. f. 4. p. 87. N:o 1. *Carabus*
Encopulatus. t. 3. f. 12.

VAR. β.

Niger elytris quadrifulcatis: punctis obscure
æneis, interjectis longitudinalibus.

Locus: Habitat cum præcedenti rarius.

N:o IX.

CARABUS GRANULATUS.

Niger supra æneus, elytris tuberculis
elevatis triplice ordine sulcisque
elevatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nucha ænea.

THORAX supra æneus, subtus obscure æ-
neo-

neo-niger, obcordatus, subtilissime punctatus, lineola longitudinali.

ELYTRA ænea, thorace latiora: fulcis tribus elevatis, interjectis tuberculis elongatis triplice serie; margine exteriori dilatato, punctato.

ALARUM rudimenta paulo quam in reliquis hujus familiæ majora, sed tamen volando minime idonea.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri.

LOCUS: Hab. in putridis.

OBSERV. Magnitudine *C. clatbrati*, sapius minor variat basi antennarum femoribusque ferrugineis.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 197. N:o 25. Car. Granulatus.*

LINN. *Syst. Nat. II. p. 668. N:o 2. var. γ. Faun. Sv. N:o 781. var. γ. Car. Granulatus.*

DE GREY *Inf. t. 4. p. 88. N:o 2. Car. Convexe punctatus.*

SCHÆFF. *Icon. t. XVIII. f. 6. t. CLVI. f. 4. male picta.*

VAR. β.

Niger elytris subvirescentibus: tuberculis elongatis triplici ordine sulcisque elevatis.

Lo.

LOCUS: Hab. cum præcedenti cui simillimus,
an var. sexus?

SYNON. LINN. *Syst. Nat.* p. 668. N:o 2. var. *β. Faun.*
Sv. N:o 781. var. *β. Car. Granulatus.*

VAR. γ.

*Niger elytris tuberculis elongatis elevatis
triplici ordine sulcisque elevatis.*

LOCUS: Hab. cum præcedentibus, quibus si-
millimus, rarior.

SYNON. LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 668. N:o 2. var. *α. Faun.*
Sv. N:o 781. var. *α. Car. Granulatus.*

N:o x.

CARABUS ARVENSIS.

*Niger supra æneus, elytris striato-pun-
ctatis: tuberculis elevatis elongatis
triplice serie.*

DESCRIPTIO.

CAPUT supra æneum, subtus nigrum; *Antenna, Palpi Maxillæque nigra.*

THORAX supra æneus, subtus obscuræ æ-
neo-niger, obcordatus, submargi-
natus lineola longitudinali.

ELYTRA ænea, punctato-striata: tuberculis
utrinque oblongis elevatis tripli-
ci ordine.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri.

MAGNIT. minor præcedenti, seu magnitudine Car. Convexi.

Locus: Hab. in Svecia australi rarius.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 196. N:o 18. Car. Arvensis.*

VAR. B.

Niger, supra subviolaceus elytris punctato striatis: tuberculis elevatis triplici ordine.

Locus: Hab. cum var. α cui simillimus an var. sexus?

OBSERV. *Differt a Carabo Granulato, quod minor & elytra punctato-striata, non vero sulci elevati. Puncta elytrorum elevata, non excavata, ut in Mantisfa Insectorum Dom. Fabricii forsitan perperam impresum est.*

N:o XI.

CARABUS AURATUS.

*Elytris viridi - æneis nitidis obtuse
sulcatis impunctatis, abdomina ni-
gro; antennis pedibusque rufis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT viridi-æneum, subtus obscurius;
Maxilla nigræ; *Palpi* rufi ultimo
articulo brunneo; *Antennæ* rufæ
apice obscuriores.

THORAX obcordatus, viridi-æneus parum
marginatus, lineola longitudinali.

ELYTRA viridi-ænea, convexa, obtuse sul-
cata, impunctata.

STERNUM nigrum, antice subvirescens.

ABDOMEN nigrum.

PEDES rufi - brunnei, interdum nigri-
cantes.

MAGNIT. Car. Violaceum æquiparat.

Locus: Hab. in humidis & sub lapidibus apud
nos rarissime, in Gallia frequens.

SYNON. FABR. MANT. *Inf.* p. 197. N:o 23. Car.
Auratus.

LINN. *Syst. Nat.* II. p. 669. N:o 7. Faun.
Sv. N:o 786. Car. *Auratus.*

DE GEER *Inf.* t. 4. p. 104. N:o 1. Car. *sul-*
catus, t. 17. f. 20.

A 4

N:o XII.

CARABUS NITENS.

Elytris viridi-æneis scabriusculis: fulcis quatuor elevatis nigris; margine, thorace capiteque aureis.

DESCRIPTIO.

CAPUT subtus nigro-æneum *nucha* aurea; *Maxilla Palpique* nigri; *Oculi* pupillati; *Antenna* nigra extrorsum vix fuscescentes.

THORAX supra aureus, convexus, marginatus; femirotundatus, lineola longitudinali, subtus obscure nigro-æneus,

ELYTRA convexa, viridi-ænea nitida, scabriuscula, fulcis quatuor elevatis nigris; tribus exterioribus postice interruptis; margo exterior elevatus, dilatatus, aureo-nitidus.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri, nitidi.

LOCUS: Habitat sub lapidibus rarius.

OBSERV. Differt a *Caraba Aurato* magnitudine dimidio minori, colore, elytris scabriusculis.

*usculis, & thorace semirotondato. Var.
 α ill. a LINNÉ sulcis elevatis coeruleis,
 corpore viridi, pedibus antennisque
 ferrugineis mihi nunquam visa est.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 197. N:o 30. *Car. Nitens.*
 LINN. *Syst. Nat.* ii. p. 669. N:o 6. *Fam. Sv.*
 N:o 785. var. β. *Car. Nitens.*
 DE GEER. *Inf. t. 4.* p. 91. N:o 6. *Car. Aureus.*

N:o XIII.

CARABUS CONVEXUS.

*Niger thorace semirotondato, elytris
 convexis subtilissime punctato-stria-
 tis, margine exteriori subviolaceo.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; Oculi albicantes,

THORAX totus niger, margine concolore,
 convexus, subtilissime punctatus,
 semirotondatus.

ELYTRA nigra, convexa, subtilissime pun-
 ctato-striata: summo margine ex-
 teriore subviolaceo nitido.

STERNUM nigrum,

ABDOMEN nigrum,

PEDES nigri.

MAGNI-

MAGNIT. præcedentis, vel Car. Violaceo
dimidio minor.

LOCUS: Hab. in Svecia australi rarius.

OBSERV. Differt a Car. Violaceo & Purpurascen-
te magnitudine duplo minori thoraceque
unicolore, semirobundato non obcordato.
A Car. GLABRATO differt magnitu-
dine, thorace rotundiore elytris puncta-
to-striatis, subviolaceo-marginatis.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 197. N:o 22. Car. Con-
vexus.

SCHNEFF. Icon, Inf. t. 3. f. II.

SECTIO SECUNDA

Thorace postice truncato.

N:o XIV.

CARABUS ROSTRATUS.

*Niger, elytris deflexis punctatis, tho-
race ovali angustiore, capite an-
gustissimo.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, elongatum, thorace di-
mi-

midio angustius; *Maxilla* longiores, prominentes.

THORAX subovatus, marginatus, convexus, truncatus, subtilissime punctatus, elytrorum vix dimidia latitudine, postice dorso subretusus.

ELYTRA nigra, subtilissime punctata, deflexa, convexa, magnam partem abdominis subtus amplectentia.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES nigri.

MAGNIT. Carabum convexum æquiparat.

LOCUS: Habitat in quisquiliis infrequens.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 198. N:o 36. *Car. Rostratus.*

LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 677. N:o 20. *Faun. Sv.* N:o 823. *Tenebrio Rastratus.*

DE GEER *Inf. t.* 4. p. 92. N:o 7. *Car. Coadunatus. t.* 3. f. 13.

CARABUS MADIDUS.

Supra niger, subtus obscure rufus, nitidus, abdomine brevior, elytris decemstriatis disco impunctatis, thorace utrinque unipunctato.

DESCRIPTIO.

CAPUT magnum rufum *nucha* nigra; *Maxilla* breviores, nigrae; *Antennae* nigrae, apice fuscescentes.

THORAX subtus rufus, supra niger nitidus, marginatus, semicircundatus, lineola longitudinali, antice latitudine fere elytrorum, angulis acutis, postice paulo angustior: puncto utrinque in angulo, excavato.

ELYTRA connata, nigra, nitida, capite thoraceque haud longiora, maxime convexa, leviter decemstriata, disco impunctato.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN breve, rufum, nitidum.

PEDES breviores, rufi.

MAGNIT. longitudine sed non latitudine praecedentis.

Lo-

Locus: Habitat apud nos rarior. Dom. STRUVE; mihi vivus nunquam occurrit.

OBSERV. Differt a sequenti, colore, elytris leviter striatis disco impunctatis, corpore magis convexo, abdomine brevior thoraceque utrinque unipunctato.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 199. N:o 54. Car. Maudius.

N:o XVI.

CARABUS LEUCOPHTHALMUS.

Niger, elytris decemstriatis disco quadripunctatis, thorace femirotundato postice utrinque bistriato.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum; *Antennae* apice fuscæscentes.

THORAX niger, nitidus, convexus, marginatus, femirotundatus, antice latitudine fere elytrorum, postice angustior, utroque angulo bistriato.

ELYTRA nigra, thorace opaciora, capite thoraceque longiora, subconvexa, decemstriata striis profundiori-

ribus; in stria secunda a futura utrinque puncta bina minutissima, excavata, vix nudis oculis conspicua, quorum alterum fere in medio, alterum apici propius.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN dimidio corpore longius, nigrum, nitidum.

PEDES nigri.

MAGNIT. latitudine præcedentis sed paulo longior.

Locus: Habitat in putridis, & sub lapidibus frequens.

OBSERV. *Carabus* a DE GEER. t. 4. p. 96. N.º 12, & a FABRICIO in *Speciebus* p. 304. N.º 29, & *Mantis* in *Insectorum* p. 198. N.º 41, sub nomine *Leucophthalmi* descriptus *Car.* *Striatum* vel *Nigritam* fistere videtur, quia alatus. Mire hi omnes *Carabi nigri* ob negligentiam auctorum confusi sunt, licet certe specie differant & optimas differentias specificas præbeant, ut suis locis dicemus. Nescio etiam qua ratione auctores octo tantum striae bujus speciei numerant, & striae binas ultimas in margine exteriori omittant leviores quidem, nudis tamen oculis bene perspicuas.

STN.

SYNON. FABR. *Syst. Ent.* p. 240. N:o 23. Car. *Leucophthalmus*.

LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 668. N:o 4. Faun.

Sv. N: 784. Car. *Leucophthalmus*.

GEOFF. *Inf. t. 1. p. 146. N:o 7.*

N:o XVII.

CARABUS TERRICOLA.

Niger abdomine longiore, elytris subviolaceis striatis disco impunctatis, thorace obcordato utrinque postice unipunctato.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum; Palpi Antennaeque fuscescentes.

THORAX niger, nitidus, obcordatus: lineola longitudinali punctoque utrinque postice excavato.

ELYTRA subviolacea, striata, disco impunctata, margine exteriori punctata, capite thoraceque multo longiora.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PE-

PEDES: *Femora & Tibia nigra; Tarsi ful-
scescentes.*

MAGNIT. præcedentis.

LOCUS: Habitat in Svecia australi rarius.

OBSERV. Differt a *Car. Leucophthalmo* elytris subviolaceis disco impunctatis, & thorace magis cordato; a *Car. Madido*, colore elytrorum, thorace obscurato & abdomine longiore. Unicum vidi elytris livido-subviolaceis; an nuper e nymphea fuit declaratus?

SYNON. *Herbst. Car. Terricola.*

N:o XVIII.

CARABUS LEPIDUS.

*Viridi-æneus, nitens, thorace semitru-
tundato postice utrinque bistriato,
elytris striatis utrinque disco
tripunctatis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT viridi-æneum, subtus obscurius; *Maxille, Palpi Oculique nigri; Antenna nigrae, basi setis quibusdam longioribus.*

THEO-

THORAX viridi-~~æneus~~, convexus, semirondatus, submarginatus, antice latitudine fere elytrorum, postice paulo angustior: in angulo utrinque profunde biftriatus, linea longitudinali levior.

ELYTRA viridi-~~ænea~~, leviter striata: in stria tertia a margine inferiore punctata tria excavata minutissima, quorum primum ad basin, secundum in medio, tertium ad apicem, non vero in ipso apice, spatium æquali distantia.

STERNUM obscure viridi-~~æneum~~.

ABDOMEN obscure viridi-~~æneum~~.

PEDES: *Femora* obscure viridi-~~ænea~~; *Tibiae* nigrae rarius rufescentes; *Tarsi* nigri.

MAGNIT. Car. Leucophthalmo minor est; sed habitus & statura eadem.

LOCUS: Habitat sub lapidibus in locis siccis.

OBSERV. Colorem jam magis jam minus cupreum induit. Differt a Carabo Cupreo, cui similis, quod ille alatus, brevior, & in disco postico elytrorum utrinque quadripunctatus.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 200. N:o. 67. Car. Lepidus.

CARABUS DEPRESSUS.

Niger depressus thorace semirotundato punctulato, nullis punctis majoribus posticis, elytris subtilissime punctatis striatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT magnum, nigrum, glabrum; *Oculi* pupillati; *Maxillæ* breviores.

THORAX niger, semirotundatus, in medio latitudine fere elytrorum, antice posticeque paulo angustior, marginatus, vix convexus, subtilissime confertissimeque punctatus, absque ullis punctis majoribus excavatis in angulis posterioribus.

ELYTRA nigra, subdepressa, subtilissime novemstriata: inter strias omnes puncta minutissima, confertissima, & intra striam primam & secundam margine exteriori puncta quædam paulo majora.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri, nitidi.

MAGNIT. paulo minor præcedenti.

Lo-

Locus: Habitat apud nos rarissime.

OBSERV. *Ab omnibus Carabis nigris hujus familiae optime distinguitur corpore subdepresso & thorace semirobundato sine ullis punctis majoribus excavatis in angulis posterioribus.*

N:o XX,

CARABUS MELANOCEPHALUS.

Niger, thorace flavo-rufo subquadrato, elytris arte juncto; pedibus flavo-rufis.

DESCRIPTIO.

CAPUT subtus rufum, supra nigrum, nitidum; *Antennae Palpique* flavo-rufi, rarius fuscescetes; *Maxillae Oculique* nigri.

THORAX laevis, rufo-flavus, subquadratus, vix rotundatus, latitudine elytrorum iisdemque arte junctus, lineola longitudinali, punctoque utrinque postice impresso.

ELYTRA nigra, substriata; in stria secunda vel tertia a margine interiore puncta quaedam minutissima, (ut in Car. Leucophthalmo & C. Le-

rido,) margo exterior punctulatus,
& basi, ubi abdomen amplexitur,
rufo-flavus.

STERNUM rufum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES longiores, rufo-flavi.

MAGNIT. dimidio minor est præcedenti.

Locus: Habitat in putridis & sub lapidibus
frequens.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 202. N:o 89. Carabus
Melanocephalus.*

LINN. *Syst. Nat. II. p. 671. N:o 22. Faun.
Su. N:o 795. Car. Melanocephalus.*

DE GEER *Inf. t. 4. p. 93. N:o 8. Car. Me-
lanocephalus, var. β.*

V A R. β.

Niger, antennis, palpis pedibusque fla-
vo-rufis.

Locus: Hab. cum var. α frequens.

OBSERV. Statura, magnitudine & habitu omni-
no var. α, quamvis thorax sternumque
nigra & latera elytrorum basi obscuriora.

SYNON. DE GEER *Inf. t. 4. p. 93. N:o 3. Car. Me-
lanocephalus var. α.*

N:o XXI.

CARABUS FLAVIPES.

*Niger, subtus piceus, pedibus rufis,
thorace subquadrato elytris arcte
juncto, elytris novemstriatis: striis
quatuor punctatis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT supra nigrum nitidum, subtus piceum; *Antennæ* fuscescentes, basi rufæ, dimidio corpore paulo longiores.

THORAX niger, subquadratus, vix rotundatus, elytrorum latitudine iisdemque arcte junctus.

ELYTRA nigra, convexa, novemstriata: in stria secunda, tertia, quinta & octava, puncta minutissima excavata, reliquæ impunctatæ.

STERNUM obscure piceum.

ABDOMEN obscure piceum.

PEDES flavo-rufi.

Locus: Habitat sub foliis ficcis rarius.

OBSERV. Differt a Car. *Melanocephalo*, cui habitu & statura similis, magnitudine duplo majori & elytris quatuor striis punctatis.

Etatis. Unicum individuum tamen vidi elytris levioribus vix punctatis at cetero huic simillimum; an distinctam constituit speciem?

STYRON. GEOFFROY *Inf. t. 1. p. 167. N:o 39. Le Bu. préste noir à pattes brunes.*

N:o xxii.

CARABUS EXCAVATUS.

Supra piceo-niger, subtus rufus, thorace cordato postice profunde bipunctato.

DESCRIPTIO.

CAPUT supra piceo-nigrum, subtus rufum; *Oculi* prominuli; *Antennae* *Palpique* rufo-fuscescentes.

THORAX supra piceo-niger, subtus obscure rufus, glaber convexus, cordatus, marginatus, antice posticeque truncatus, lineola longitudinali punctoque magno utrinque angulo postico profunde excavato.

ELYTRA piceo-nigra, integra, thorace latiora, subtilissime punctato-striata; punctis utrinque tribus paulo majoribus, licet vix nudis oculis conspicuis in stria tertia a mar-

margine interiore, quorum alterum baseos, alterum in medio, & tertium magis ad apicem.

STERNUM rufum.

ABDOMEN rufum.

PEDES rufi.

MAGNIT. paulo longior sed vix latitudine Carabi Melanocephali.

LOCUS: Habitat apud nos minus frequens.

VAR. β .

Totus testaceus capite thoraceque paulo obscurioribus.

OBSERV. *Simillimus magnitudine & statura varietati præcedenti. Non nisi unicum vidi, qui nuper e nymphea declaratus colorem in statu adultiore forte mutaturus esset. Species hæc optime dignoscitur thorace cordato profunde bipunctato.*

CARABUS HUMERALIS.

Niger thorace obcordato, elytris striato-punctatis truncatis antice rufis, pedibus rufo-flavis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, latitudine thoracis, subtilissime punctatum; *Antenna Palpique* rufi: *Oculi* prominuli, nigri.

THORAX niger, cordatus, acute marginatus, antice posticeque truncatus maxime convexus, subtilissime punctatus sine ullis punctis majoribus in angulo posteriore excavatis.

ELYTRA nigra, antice ad quartam circiter partem totius longitudinis obscure rufa, thorace latiora, subtilissime punctato-striata, apice truncata, abdominis vix longitudine, ut in Carabo truncatello.

STERNUM piceum, vel obscure-rufum.

ABDOMEN piceum, nitidum.

PEDES rufo-flavi.

MAGNIT. præcedentem vix attinet.

Lo-

Locus: Habitat in lignis putridis minus frequens.

VAR. β .

Niger thorace obcordato rufo, elytris macula bascos rufo-flava in margine exteriori, ore, antennis pedibusque rufo-flavis.

Locus: Habitat cum var. α , cui magnitudine, habitu & statura simillimus.

N:o XXIV.

CARABUS ROTUNDATUS.

Rufo-fuscus, subtus dilutior, pedibus flavis, thorace postice rotundato inangulato, elytris striatis disco utrinque tripunctatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT subtus rufum, *nucha* rufo-subænea; *Antennæ* rufæ.

THORAX rufo-fuscus, lævissimus, convexus, marginatus, antice truncatus

tus, postice rotundatus, inangulatus, vix punctis ordinariis posticis impressis.

ELYTRA rufo-fusca, nitida, striata: in stria tertia a margine interiore utrinque puncta tria excavata, minutissima, vix nudis oculis conspicua.

STERNUM rufum, nitidum.

ABDOMEN rufum, nitidum

PEDES flavi, nitidi.

MAGNIT. Carabum viridanum æquiparat.

LOCUS: Habitat apud nos minus frequens.

OBSERV. *Differt a præcedentibus colore, magnitudine minori, & thorace postice rotundato, minime cordato, truncato.*

VAR. β.

Niger elytris piceis.

LOCUS: Hab. in Uplandia rarius; semel initio mensis maji plures sub cortice salicis emortuæ reperi.

OBSERV. *Simillimus magnitudine, habitu & statura, varietati præcedenti, nisi quod puncta discoidalia elytrorum paulo obsoletiora sint.*

FAMILIA SECUNDA

ALATI.

SECTIO PRIMA

Thorace obcordato.

N:o XXV.

CARABUS SPINIGER.

*Lævis niger, subtus piceus, elytris
obsolete novemstriatis, pedibus pos-
ticipis basi appendiculo spinoso.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, elongatum, inter oculos bifurcatum; *Maxilla* longiores, *Palpi* picei; *Antenna* apice fusciscentes; *Oculi* pupillati.

THORAX niger, convexus, marginatus, impunctatus, lineola longitudinali leviori, dorso postice in angulis subretuso, non vero striato.

ELYTRA thorace latiora, nigra, convexa, læviora: striis novem fere obsoletis; in stria secunda a margine
ex-

exteriore puncta paullo majora excavata, in reliquis vero minutissima nudis oculis inconspicua.

ALÆ amplissimæ, albo-hyalinæ nervis ferrugineis.

STERNUM piceum,

ABDOMEN glabrum, convexum, piceum.

PEDES picei; *Femora* postica basi appendiculo spinoso longitudine fere dimidii femoris.

MAGNIT. Longitudine Carabi Violacei sed angustior.

LOCUS: Habitat sub lapidibus minus frequens.

OBSERV. *Differt ab omnibus Carabis nigris hujus familiae appendiculo spinoso in femoribus posterioribus, cum reliquæ species appendiculo truncato gaudent.*

N:o XXVI.

CARABUS STRIATUS.

Niger thorace postice foveola utrinque biloba, elytris striis novem profundioribus: punctis tribus discoidalibus.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; *Maxilla Palpique* picei; *Antennæ* apice fuscescentes; *Oculi* pupillati.

THORAX niger, nitidus, marginatus, parum convexus, lineola longitudinali profundiori foveolaque biloba utrinque in angulo posteriore excavata.

ELYTRA nigra, convexa, marginata, novemstriata: punctis tribus minutissimis in stria tertia a margine interiore, quorum primum ad basin, secundum in medio, & tertium apici propius est.

ALÆ albo-hyalinæ nervis flavescens.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri.

MAGNI-

MAGNIT. præcedenti paulo minor.

Locus : Habitat in putridis & sub lapidibus frequens.

OBSERV. Magnitudo bujus speciei non variat, licet DE GEER loco citato, & FABRICIUS in Spec. Inf. pag. 305 ita meminerint : etenim hanc speciem cum Carabo Leucophtbalmo & Nigrita sine dubio confuderunt, qui tamen sane diverſi : differt enim a C. Leucophtbalmo magnitudine majori, alis, thorace cordato & elytris utrinque disco tripunctato ; a Car. Nigrita magnitudine duplo majore & thorace cordato.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 198. N:o 41. Car. Leucophtthalmus.

DE GEER Inf. t. 4. p. 96. N:o 12. Car. Nigro-friatus.

N:o xxvii.

CARABUS FLAVICORNIS.

*Niger elytris substriatis impunctatis,
margine thoracis, antennis pedi-
busque rufo-pallidis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, convexum, punctis duobus frontalibus ferrugineis: *Maxillæ* ferrugineæ; *Palpi Antennæque* pallidiores, pilis quibusdam longioribus; *Oculi* albicantes.

THORAX niger, convexus, summo margine rufescente elevato.

ELYTRA nigra, substriata, impunctata, in altero Sexu antice ad futuram rufescentia.

ALÆ albo-hyalinæ nervis flavescentibus.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, ano rufescente.

PEDES pallide rufi.

MAGNIT. Carabum *Leucophthalmum* æquiparat.

Locus: Habitat in Sveciâ australi rarius.

Oss-

OBSERV. *Carabo spinigero affinis sed duplo fere minor, nec femora postica spinigera.*

SYNON. FABR. MANT. *Inf. p. 199. N:o 50. Car. Flavicornis.*

N:o XXVIII.

CARABUS SABULOSUS.

*Niger, thorace, limbo elytrorum
pedibusque pallidis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; *Maxilla* ferrugineæ; *Antenne Palpique* pallide flavi; *Oculi* prominuli.

THORAX pallidus, brevis, convexus, impunctatus, marginatus, subtus, cum margine summo antico & postico, niger.

ELYTRA anteriori parte thoracis non multo latiora, subtilissime striato-punctata, punctis quibusdam discoïdalibus paulo profundioribus, subconvexa, margine exteriori & posteriore pallide flavo, in altero sexu limbo latiore.

ALÆ.

STER-

STERNUM obscure ferrugineum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES pallide flavi; *Femora* basi ferruginea.

MAGNIT. paulo minor præcedenti.

LOCUS: Habitat apud nos rarius.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 199. N:o 47. *Carabus Sabulosus*.

LINN. *Syst. Nat.* II. p. 670. N:o 15. *Faun. Sv.*
N:o 791. *Car. Lsvidus*.

N:o XXIX.

CARABUS MULTIPUNCTATUS.

Obscure subæneus, elytris punctatis vagis plurimis impressis.

DESCRIPTIO.

CAPUT obscure subæneum; *Maxilla, Antennæ Palpique* nigri; *Oculi* pupillati.

THORAX obscure subæneus margine nitidore; lineola longitudinali anguloque utrinque posteriore dorso excavato.

D

ELY-

ELYTRA obscure ænea, convexa: punctis plurimis majoribus disco impressis, margine æneo nitido.

ALÆ amplæ, albo-hyalinæ, corpore longiores, summo margine anteriore exteriore rufescente.

STERNUM obscure subæneum.

ABDOMEN obscure subæneum.

PEDES: *Femora* obscure subænea; *Tibiae* & *Tarsi* magis nigricantes.

LOCUS: Habitat in pratis humidis sub lapidibus, tempore vernali frequens.

SYNON. *FABR. Mant. Inf. p. 201. N:o 32. Carab. Multipunctatus.*

LINN. Syst. Nat. 11. p. 672. N:o 32. Fawn. Sv, N:o 805. Carab. Multipunctatus.

N:o xxx.

CARABUS BOREALIS.

*Niger thorace obscure æneo, elytris
obscuræ æneis: punctis discoidalibus
duplice serie impressis; summo
margine pedibusque rufis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *nucha* obscure subænea;
Oculi minores; *Maxilla Palpique*
nigri; *Antennæ* apice fuscescen-
tes.

THORAX obscure subæneus, marginatus,
lineola levisissima longitudinali pun-
ctoque profunde excavato utrin-
que in angulo posteriore.

ELYTRA thorace latiora, obscure subæ-
nea, substriata: punctis plurimis
majoribus discoidalibus duplice
serie, exteriori abbreviata, im-
pressis, margine nitidiore; summo
margine abdomen amplectente,
rufo.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES rufi *geniculis* nigris.

MAGNIT. vix præcedentis.

LOCUS: Sub lapide ad templum Karungi Bot-niæ occidentalis femel inveni mense Julii.

OBSERV. *Habitu & statura præcedentis, sed differt colore & elytris regulariter punctatis.*

N:o xxxi.

CARABUS NIVALIS.

Niger femoribus rufis, thorace impunctato, elytris punctato-striatis: punctis quibusdam discoidalibus majoribus; marginalibus nullis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; *Oculi, Antennæ, Maxillæ Palpique* concolores.

THORAX niger, brevis, vix longitudine capitis, convexus, acute marginatus, postice impunctatus.

ELYTRA nigra, thorace latiora, capite thoraceque duplo longiora, striata, subtilissime in stria punctata: punctis

ctis tribus vel quatuor paulo majoribus in stria tertia a margine interiore, margine exteriori impunctato.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES: *Femora* rufa; *Tibiae Tarisque* nigri.

MAGNIT. Car. Sabuloso fere duplo minor.

Locus: Habitat in fummis alpinis Lapponiæ Lulensis, in ipsa nive cursitans.

N:o xxxii.

CARABUS ASSIMILIS.

Niger, thorace capite longiore postice impunctato, elytris striatis, margine punctato.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum.

THORAX niger, capite longior, antice, non vero postice latior, convexus, acute marginatus, angulis posticis impunctatis.

D 3

ELY-

ELYTRA nigra, capite thoraceque longiora, striata, margine exteriore punctulato; punctis utrinque tribus minutissimis in stria tertia a margine interiore.

ALÆ albo-hyalinæ.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum,

PEDES nigri, vel obscure picei,

MAGNIT. præcedentis.

LOCUS: Hab. in Scania. Dom. QVENSEL.

OBSERV. *Habitu & statura præcedenti simillimus, ut diu hæserim, utrum varietas, vel species distincta esset: sed loco natali omnino differunt, nec in illo femora nigra, & margo punctatus: Differt a Car. striato, magnitudine duplo minori & thorace postice non punctato.*

N:o XXXIII.

CARABUS OBLONGO-PUNCTATUS.

Niger elytris substriatis: punctis dorsalibus & marginalibus plurimis impressis, thorace utrinque postice unipunctato.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; nitidum; *Palpi, Antennae Maxillaeque* concolores.

THORAX niger, nitidus, marginatus, convexus, lineola longitudinali punctoque utrinque excavato in angulo posteriori.

ELYTRA nigra, saepius thorace opaciora, capite thoraceque haud multo longiora, subtilissime striata: punctis plurimis longitudinalibus minutis, nudis tamen oculis bene conspicuis, disco & margini exteriori impressis.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri, nitidi.

MAGNIT. Carabum Multipunctatum aequiparat.

D 4

Lo-

Locus: Hab. sub lapidibus.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 202. N:o 80. Car. Oblongo-punctatus.*

V A R. β .

Niger, *nucha thoraceque supra obscure subæneis, elytris obscure subæneis substriatis: punctis dorsalibus & marginalibus; tarsis rufescentibus.*

Locus: Hab. cum var. α , cui facie, magnitudine & statura simillimus.

OBSERV. *Differt a Car. Multipunctato & Boreali, quod puncta elytrorum multo minora, nec thorax postice tam profunde punctatus; a Car. Nivali, quod elytra respectu magnitudinis, breviora, & margine punctata; a Car. Assimili: thorace postice punctato, & elytris punctis discoialibus maioribus.*

N:o XXXIV.

CARABUS VIRIDANUS.

*Niger nucha thoraceque æneis, ely-
tris ferrugineis: macula postica
communi nigro-ænea.*

DESCRIPTIO.

CAPUT subtus nigrum, supra viridi-æne-
um, impunctatum; *Maxilla* ni-
græ; *Palpi* ferruginei; *Antenna*
basi ferrugineæ, apice nigræ; *O-*
culi fuscescentes.

THORAX subtus niger, rarius æneo-niger,
supra viridi-æneus, submargina-
tus, postice magis quam in reli-
quis hujus sectionis, angustatus.

ELYTRA thorace latiora, striata, ferruginea:
macula magna postica communi
subrotunda, nigro-ænea.

ALÆ longiores, albo-hyalinæ, macula
marginali subfusca,

STERNUM nigrum,

ABDOMEN nigrum.

PEDES ferruginei,

MAGNIT. duplo minor præcedenti.

Locus: Habitat sub lapidibus & in quisquilis.

SYNON. FABR. *Mant. Inſ.* p. 204. N:o 105. *C. Viridanus*. p. 204. N:o 109. *Car. Prasinus*.
SCHÆFF. *Icon. t. XXXI. f. XIII.*

THUNBERG. *Nov. Spec. Inſect.* 4. 74. f. 87.
Car. Prasinus.

VAR. β .

Niger pedibus elytrisque ferrugineis: macula communi nigro-ænea.

Locus: Hab. rarius cum var. α , cui simillimus, sed capite & thorace totis nigris.

N:o xxxv.

CARABUS RUFESCENS.

Rufus, antennis subpilosis pedibusque pallidioribus, thorace glaberrimo, elytris punctato-striatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT rufum, glabrum, latitudine fere thoracis, *Antennæ* subpilosæ, *Maxil-*

xilla Palpique pallidiores; Oculi nigri.

THORAX rufus, glaberrimus, postice impunctatus, marginatus, maxime convexus, longitudine fere duplo latior, lineola longitudinali, vix nudis oculis conspicua.

ELYTRA rufa, dimidio corpore longiora, convexa, punctato-striata.

STERNUM rufum.

ABDOMEN rufum.

PEDES rufo-testacei.

MAGNIT. præcedentis.

Locus: Habitat in truncis arborum putridis rarius.

VAR. β .

Rufus vertice anoque nigris.

Locus: Hab. apud nos rarissime.

OBSERV. Simillimus varietati α .

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 204. N:o 104. Car. Rufescens.*

XXXVI.

CARABUS CYANOCEPHALUS.

*Cœruleus nitidus, thorace pedibusque
rufo-flavis, elytris abdomine bre-
vioribus subtruncatis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT cœruleum, rarius nigrum; *Antennæ* nigræ, articulis duobus primis ferrugineis.

THORAX rufo-flavus, glaberrimus, linea longitudinali excavata, marginatus, antice posticeque truncatus, angulis posticis impunctatis, acutissimis.

ELYTRA cœruleo-micantia, nitidissima, subtruncata, abdomine paulo breviora, vix striata, thorace latiora, subdepressa.

STERNUM nigro-cœruleum, rarius ferrugineum.

ABDOMEN nigro-cœrulescens.

PEDES variant: nunc toti flavi, nunc geniculis, interdum *Tibiis Tarsisque* nigris.

MAGNIT. Car. Viridanum æquiparat.

Lo-

Locus: Habitat in putridis & intra folia arborum sat frequens.

STNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 203. N:o 90. *Car. Cyanocephalus.*

LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 671. N:o 21. *Faun. Sv.* N:o 794. *C. Cyanocephalus.*

DE GREY *Inf. t. 4. p. 100. N:o 17. t. 3. f. 17. Car. Cyanocephalus.*

SCHÆFF. *Icon. t. XI. f. 14.*

N:o XXXVII.

CARABUS PUBESCENS.

Flavo-ferrugineus subpubescens, abdomine, thorace medio elytrorumque disco postico nigris.

DESCRIPTIO.

CAPUT ferrugineum, thoracis vix latitudine; *Oculi* cinerascens.

THORAX tenuissime pubescens, marginatus, postice impunctatus, flavo-rufus: vitta longitudinali media, antice & postice latiore.

ELYTRA striata, thorace paulo latiora, te-

STERNUM violaceum.

ABDOMEN latissimum, violaceo-nigrum.

PEDES nigri.

MAGNIT. inter maximos Europæ Carabos.

LOCUS: Habitat in arboribus, ubi noctu devorat larvas lepidopterorum, apud nos rarius, in Europa australi frequens.

OBSERV. *Vix a Car. Scrutatore FABRICII, ex America septentrionali, satis differt, quamvis ille major, thorace elytrisque aureo-purpurascenti marginatis.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 197. N:o 34. Car. Sycophanta.*

LINN. *Syst. Nat. II. p. 670. N:o 12. Faun. Sv. N:o 790. Car. Sycophanta.*

DE GEER *Inf. t. 4. p. 105. N. 2. t. 17. f. 19. Car. Sycophanta var. Americana.*

SCHÆFF. *Icon. t. LVI. f. VI.*

N:o XXXIX.

CARABUS INQUISITOR.

Æneo-fuscus, subtus cum margine æneo-viridis; antennis pedibusque nigris, elytris striato-subrugosis; punctis triplice ordine.

DESCRIPTIO:

CAPUT fusco-æneum; *Maxillæ Palpique nigri; Antennæ* basi nigræ, apice fuscescentes.

THORAX subtus æneo-virescens, dorso æneo-fusco, margine elevato nitidiore, obovatus, subtilissime punctatus, longitudine fere duplo latior, lateribus rotundatis, anteice posticeque truncatus, puncto utrinque postico angulari excavato.

ELYTRA æneo-fusca, margine æneo nitidiore, thorace duplo fere latiora, capite thoraceque duplo longiora: striis sedecim longitudinalibus, rugis transversalibus confertissimis, vix nudis oculis conspicuis punctisque quibusdam majoribus triplici serie excavatis.

STERNUM viridi-æneum.

ABDOMEN viridi-æneum, latissimum.

PEDES nigri.

MAGNIT. dimidio fere minor est præcedenti.

Locus: Habitat in fylvis; in horto Carlbergiano semel magnam ejus copiam, sub lapidibus & foliis putridis inveni, versus finem mensis maji.

OBSERV. *Variat interdum elytris nigrescentibus. Differt a Car. Sycophanta, magnitudine, colore, thorace postice punctato, & elytris transverse subrugosis.*

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 197. N:o 31. Carabus Inquisitor.

LINN. Syß. II. p. 669. N:o II. Faun. Sv. N:o 789. Car. Inquisitor.

DE GEER Inf. t. 4. p. 94. N:o IX. Car. Inquisitor.

N:o XL.

CARABUS RETICULATUS.

Niger, thorace æruginoso postice emarginato, elytris æruginosi nigro-reticulatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *nucha* vix virescente; *Antennæ* apice fuscescentes.

THORAX subtus niger, supra æruginosus, obovatus, marginatus, margine nitidiore, subtilissime punctatus, longitudine duplo latior, lateribus rotundatis, antice truncatus, postice emarginatus; (minus tamen quam in *Carabis* plerisque primæ familiæ sectionis primæ).

ELYTRA æruginosa, thorace fere duplo latiora, capite thoraceque vix duplo longiora, punctis tripliee serie excavatis subtilissime reticulata; reti elevata nigra, qui color tamen viridi mixtus, nisi bene observatur, vix discerni potest.

STERNUM nigrum, antice subvirescens.

ABDOMEN nigrum, latissimum.

PEDES nigri.

MAGNIT. longitudine præcedentis, sed abdomine paulo latiore.

LOCUS: Habitat in Svecia australi rarius.

OBSERV. *Differt a præcedentibus colore, thorace postice emarginato elytrisque reticulatis; variat rarius corpore supra omnino nigricante.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 197. N:o 33. Car. Reticulatus.*

N:o XLI.

CARABUS AURO-PUNCTATUS.

Niger lævis, thorace postice emarginato, elytris subtilissime punctato-striatis, punctisque paulo majoribus triplice serie excavatis.

DESCRIPTIO MARIS:

CAPUT totum nigrum; *Antennæ* apice fuscæ.

THORAX niger, lævis, marginatus, obovatus, longitudine fere duplo latior,

tior, lateribus rotundatis; antice truncatus, postice subemarginatus.

ELYTRA nigra, thorace parum latiora, subtilissime punctato-striata: punctis paulo majoribus triplice ferie excavatis.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES nigri; *Tibia* curvatæ.

MAGNIT. longitudine præcedentem fere superat, sed latitudine non æquiparat.

FOEMINA mari simillima, sed colore supra subvirescente, punctis æneis triplice ferie, abdomine paulo latiore tibiisque anterioribus brevioribus.

LOCUS: Habitat in Svecia australi rarius.

OBSERV. Differt a *Carabo Inquisitore*, colore, thorace emarginato & elytris levioribus, a *Car. Reticulato*, colore, corpore magis elongato & elytris baud reticulatis.

SYNON. HERBST. *Carabus Auro-punctatus*.

FABR. *Mant. Inf.* p. 197. N:o 35. *Car. Indagator*? affinis ei videtur, sed apterus ille, an a Cæl. Auctore oculo modo fugitivo descriptus.

CARABUS SEXPUNCTATUS.

*Capite thoraceque viridi-aureis, ely-
tris rubro-æneis: punctis utrinque
sex impressis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT viridi-æneum, subtus obscurius;
Oculi, Maxillæ, Antennæ Palpique
nigri.

THORAX supra viridi-aureus, marginatus,
subtus nigro-cærulescens, longi-
tudine parum latior; postice sub-
angustatus, puncto utrinque in
angulo.

ELYTRA rubro-ænea, nitidissima, substri-
ata; inter striam secundam & ter-
tiam puncta utrinque sex longi-
tudinalia excavata, margine vi-
rescente punctulato.

ALÆ albo-hyalinæ, puncto magno mar-
ginali fusco.

STERNUM fusco-æneum.

ABDOMEN fusco-æneum.

PEDES: *Femora* fusco-ænea; *Tibiae Tarfi-
que* nigri.

MAGNIT. Car. Marginatum æquiparat.

Lo-

Locus: Habitat in hortis frequens, in aprico cursitans.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 202. N:o 83. *Car. Sexpunctatus.*

LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 672. N:o 35. *Faun. Sv.* N:o 807. *Car. Sexpunctatus.*

DE GEER *Inf. t.* 4. p. 99. N:o 16. *Car. Sexpunctatus.*

SCHÆFF. *Icon. Inf. t.* LXVI. f. 7.

V A R. β.

Viridi-æneus elytris concoloribus.

Locus: Habitat cum præcedenti, cui statura, habitu & magnitudine omnino similis.

N:o XLIII.

CARABUS MARGINATUS.

Viridis elytris glabris, disco utrinque tripunctato; margine exteriori undique æquali latitudine, testaceo.

DESCRIPTIO.

CAPUT viride, nitidum; *Antennæ, Maxillæ, Oculi Palpique* nigri.

E 4

THO-

THORAX viridis, nitidus, longitudine vix latior, marginatus, summo margine testaceo, lineola longitudinali punctoque utrinque in angulo posteriore, excavato.

ELYTRA viridia, subdepressa, capite thoraceque longiora, glaberrima subtilissime striata, thorace latiora, margine exteriori punctulato, testaceo: punctis utrinque tribus discoidalibus minutis excavatis, quorum primum bascos, in stria tertia a margine interiore, reliqua in stria secunda fere in medio.

ALÆ albæ, macula magna costali fusca.

STERNUM nigro-viride, nitidum.

ABDOMEN viride, vel nigro-cœrulescenti-nitidum.

PEDES: *Femora* nigra, rarius pallescentia; *Tibiæ* pallidæ; *Tarsi* fuscescentes.

MAGNIT. præcedentis.

LOCUS: Habitat in arvis & pratis subhumidis.

SYNON. FAHR. Mant. Inf. p. 202. N:o 84. Car. Marginatus.

LINN. Faun. Sv. N:o 804. Car. Marginatus.

N:o XLIV.

CARABUS VESTITUS.

Subtus niger, supra viridi-æneus, antennis pedibusque pallidis, elytris pubescentibus punctato-striatis, punctis majoribus nullis; limbo exteriori pallido postice latiore.

DESCRIPTIO.

CAPUT subtus nigrum, supra viridi-æneum, nitidissimum, glaberrimum; *Oculi* nigri; *Palpi* pallide ferruginei; *Antennæ* pallidæ, longitudine dimidii corporis.

THORAX latitudine longitudinis, subtus niger, supra viridi-æneus pube tenuissima, linea longitudinali punctoque utrinque baseos.

ELYTRA viridia, striata, subtilissime punctata, pube tenuissima certo situ ferrugineo-micanti penitus tecta; punctis discoidalibus majoribus nullis, limbo exteriori pallido, apice latiore.

ALÆ albo-hyalinæ.

STERNUM nigrum, pube tenuissima.

E 5

ABDO-

ABDOMEN nigrum, pube tenuissima, cetero situ ferrugineo-micanti.

PEDES pallidi.

MAGNIT. Car. Marginatum æquiparat.

LOCUS: Habitat in Scania sub lapidibus rarius.
Dom. QVENSEL.

SRNON. LINN. *Syst. Nat.* 11, p. 670 N:o 16. Car. *Marginatus*.

GEOFFR. *Ins.* 1. p. 162, N:o 41. *Le Bupreste*
verd à bordure.

PALLAS *Reise* 1. App, N:o 39. Car. *Marginatus*.

VAR. β .

Subtus niger, supra violaceus, antennis pedibusque pallidis, elytris pubescentibus punctato-striatis; punctis discoidalibus nullis; limbo exteriori pallido postice latiore.

LOCUS: Hab. cum var. α , cui colore supra excepto, simillimus.

OBSERV. Differt a Car. Marginato, cui habitu & statura similis, corpore pubescente, elytris punctis discoidalibus nullis, limbo postice latiore testaceo pedibusque totis pallidis. Hanc Speciem ill. a LINNÉ in *Systemate Naturæ* loco citato descripsit, præcedentem vero in *Fauna Svecica* sub eodem nomine, licet certe diversæ sint.

N:o XLV.

CARABUS OBSCURUS.

*Niger, supra obscure nigro-subæ-
neus, elytris striatis, disco utrin-
que tripunctato.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *nucha* obscure nigro-sub-
ænea.

THORAX subtus niger, dorso obscure sub-
æneo, glaberrimo, marginatus,
convexus, longitudine paulo la-
tior, lineola longitudinali punctis-
que ordinariis posticis excavatis;
antice truncatus, angulatus, po-
stice rotundatus.

ELYTRA obscure nigro-subænea, latitudine
haud duplo longiora, nitida, con-
vexa, striata: inter striam secun-
dam & tertiam puncta tria minu-
tissima excavata; margo etiam
ipse exterior punctatus est.

STERNUM nigrum, opacum; rarius obscure
subæneum.

ABDOMEN nigrum, opacum, rarius obscure
subæneum.

PE-

PEDES nigri.

MAGNIT. præcedentis.

LOCUS: Habitat sub lapidibus in Uplandia, tempore vernali frequens.

OBSERV. *Difficillime dignoscendus: Variat colore interdum magis nigro, interdum magis cyaneo. Differt a Car. Nigrita & Aterrimo, thorace rotundato: a C. Picipede, magnitudine, elytris profundius striatis disco punctatis; a C. Pilicorni, cui etiam affinis: antennis nudis & punctis elytrorum levioribus.*

N:o XLVI.

CARABUS PICIPES,

Niger nitidus, pedibus fuscis, elytris subtilissime striatis disco impunctatis fuscis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace paulo angustius.

THORAX niger, lævis, longitudine fere latitudinis, antice truncatus, angulala-

latus, lineola longitudinali levissima punctisque ordinariis majoribus.

ELYTRA fusca, subtilissime striata, capite thoraceque longiora, disco impunctato, margine subpunctato.

ALÆ amplæ, albæ, puncto marginali subfusco.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES fusci, interdum subferruginei.

MAGNIT. duplo minor præcedenti.

LOCUS: Habitat in humidis & sub lapidibus.

OBSERV. Differt a *Carabo Rotundato*, cui magnitudine & habitu simillimus, quod ille alatus, elytra profundius striata, disco utrinque tripunctata.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 203. N:o 98. Car. Principis.

VAR. β .

Totus niger.

LOCUS: Habit. cum var. præcedenti, cui simillimus.

CARABUS PILICORNIS.

Elytris punctato-striatis, disco utrinque tripunctato, antennis pilosis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *nucha* obscure ænea; *Antenna* pilis longioribus hirtæ, fuscescentes, primo articulo æneæ; *Palpi* fuscescentes, *Oculi* prominuli, nigri.

THORAX subtus niger, dorso obscure æneo, marginatus, rotundatus, lineola longitudinali punctoque utrinque ordinario postico.

ELYTRA obscure ænea, punctis minutissimis striata: punctis tribus majoribus, nudis oculis bene conspicuis in serie disco impressis.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES rufi; *Femora* nigra.

MAGNIT. Car. Marginatum æquiparat.

LOCUS: Habitat ad littora humida & sub lapidibus.

OBSERV. Optime antennis valde pilosis dignoscitur.
STN-

SYNON. FABR. MANT. *Inf.* p. 200. N:o 65. *Car.*
Pilicornis.

N:o XLVIII.

CARABUS QVAD RIPUNCTATUS.

Niger, supra obscure subæneus, nitidus, depressus, elytris substriatis: punctis quatuor discoidalibus serie impressis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *nucha* obscure subænea.

THORAX subtus niger, supra obscure subæneus, acute marginatus, lineola longitudinali, punctis ordinariis nullis.

ELYTRA thorace multo latiora, obscure subænea, substriata: punctis quatuor longitudinalibus in disco profunde impressis.

ALÆ amplæ, albo-hyalinæ, macula parva marginali fusca.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN latum, nigrum, nitidum.

PEDES nigri, nitidi.

MAGNI-

MAGNIT. dimidio minor præcedenti.

Locus: Habitat passim.

OBSERV. Variat variis punctis utrinque quinque impressis.

SYNON. DE GEER Inf. t. 4. p. 102. N:o 21. Car:
Quadrupunctatus.

N:o XLIX.

CARABUS BIPUSTULATUS.

Pubescens niger, elytris crenato-striatis: maculis duabus ferrugineis.

DESCRIPTIO.

CAPUT minutissimum, totum nigrum; Oculi prominuli.

THORAX capite duplo latior, villosus, orbiculatus, undique punctatus, punctis ordinariis majoribus nullis.

ELYTRA thorace latiora, reliquo corpore duplo longiora, crenato-striata, nigra: maculis duabus magnis ferrugineis, quarum anterior in margine exteriori, major; posterior subrotunda.

STER-

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES. nigri.

MAGNIT. Car. Marginato paulo minor.

Locus: Habitat sub lapidibus.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 205. N:o 106. Car. Bipustulatus.*

LINN. *Syst. Nat. II. p. 673. N:o 39. Faun. Sv. N:o 808. Car. Crux Major.*

SCHÆFF. *Icon. t. 10. f. 13. minus accurate a Dem. FABRICIO ad sequentem relata.*

N:o L.

CARABUS CRUX MAJOR.

Niger glaber, thorace pedibusque rufis, elytris truncatis convexis, thorace duplo latioribus, ferrugineis cruce nigra.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum; *Antenna* basi ferrugineæ.

THORAX rufus, glaberrimus, suborbiculatus, vix capite latior.

F

ELY-

ELYTRA truncata, convexa, abdomine paulo breviora, thorace duplo latiora, levissime striata, ferruginea, macula scutellari; fascia lata obliqua in medio; futura & margine postico nigris.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES rufi *geniculis* fuscescentibus.

MAGNIT. longitudine vix Car. Picipedis, sed abdomine latiore.

Locus: Habitat sub foliis putridis & lapidibus tempore vernali.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 204. N:o 94. Car. *Cruce Major*.

LINN. *Syst. Nat.* II. p. 673. N:o 40. Fawn. Sv. N:o 809. Car. *Cruce minor*.

SCHÆFF. *Icon. t.* 18. f. 8. a Dqm. FABRICIO falso ad Car. *Crucem minorem* citata.

N:o LI.

CARABUS QUADRIMACULATUS.

Niger, thorace sternoque rufo-ferrugineis, elytris obtusissimis depressis, thorace paulo latioribus bimarculatis, pedibus flavo-lividis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum; *Antenna, Maxilla; Palpique* flavo-lividi.

THORAX rufus, capite vix latior, lineola longitudinali, glaberrimus, punctis ordinariis nullis, marginatus, subrotundus, postice subangustatus.

ELYTRA nigro-fusca, substriata, thorace haud duplo latiora, truncata, obtusissima, abdomine paulo breviora, depressa: macula ovata livida bascos, & alia apicis, ejusdem magnitudinis.

ALÆ albæ, macula marginali fusca.

STERNUM rufo-ferrugineum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES flavo-lividi.

MAGNIT. longitudine præcedentis, sed angustior. F 2 Lo-

Locus: Habitat apud nos rarius.

OBSERV. *Differt a precedenti, cui affinis, colore, elytris depressis thorace baud duplo latioribus.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 205. N:o 113. Car. Quadrimaculatus.*

LINN. *Syst. Nat. 11. p. 673. N:o 41. Faun. Sv. N:o 813. Car. Quadrimaculatus.*

N:o LII.

CARABUS CRUX MINOR.

Niger, thorace pedibusque rufis, elytris integris thorace vix latioribus, basi rufis, postice nigris: macula communi rufa.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum, thorace paulo angustius; *Palpi & Antennarum basibus rufa.*

THORAX rufus, marginatus, rotundatus, glaberrimus, antice truncatus, postice subangustatus: lineola longitudinali punctisque ordinariis profundioribus.

ELY-

ELYTRA thorace paulo latiora, striata, basi ad tertiam partem longitudinis rufa, postice nigra: macula communi subrotunda rufa; futura ad hanc maculam, non vero postice, tenuissime rufa.

ALÆ albæ, vel subflavescentes.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES rufi.

MAGNIT. longitudine Car. Cruels majoris, latitudine Car. Agilis.

Locus: Habitat sub foliis putridis, primo vere.

OBSERV. *Differt a Car. Cruce majore: colore, thorace antice latiore elytrisque angustioribus, baud truncatis. Synonyma LINNEANA & SCHÆFFERIANA, a Dom. FABRICIO, huic speciei attributa, ad Car. Crucem majorem pertinent, ut supra notavi.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 204. N:o 100. Car. Crux minor.*

N:o LIII.

CARABUS USTULATUS.

Niger, supra obscure nigro-subæneus, thorace subdepresso: punctis ordinariis profundioribus, elytris obsolete pallide fasciatis,

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, seu obscure nigro-subæneum; *Oculi* prominuli, *Antennæ Palpique* nigri.

THORAX niger, lævis, glaber, supra obscure nigro-subæneus, marginatus, subdepressus, lineola longitudinali punctisque ordinariis profundioribus.

ELYTRA obscure nigro-subænea, punctato-striata, thorace haud multo latiora: fascia obsoleta postica pallida, interdum quoque fasciola anteriore.

ALÆ albæ.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES nigri.

MAGNIT. inter minores est, & Car. bipunctatum vix superat. Lo-

Locus: Habitat in putridis frequentior.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 205. N:o 115. Car. *U-*
fulatus.

LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 673. N:o 38. *Faun.*
Su. N:o 810. Car. *Ufulatus.*

V A R. β.

Niger, supra obscure nigro-subæneus nitidus,
thorace nitidiore, elytris maculis qua-
tuor magnis obsoletis rufo-pallidis, pe-
dibus antennarumque basi ferrugineis.

Locus: Habitat cum præcedenti frequens.

OBSERV. *Simillimus habitu & statura var. α, sed*
paulo major, seu magnitudine Carab.
Picipedis.

V A R. γ.

Niger, vel obscure nigro-æneus: margine ex-
teriore pallide denticulato, pedibus
brunneis.

Locus: Hab. apud nos minus frequens.

OBSERV. *Magnitudine & summa similitudine cum*
var. α notatur.

SYNON. Car. *Dentellus.* THUNBERG. *Mus. Nat. A. U.*
pag. 50.

V A R. δ.

Niger, fasciis binis obliquis inæqualibus
testaceis, fenestratis, marginem haud
attingentibus.

Locus: Habitat rarius apud nos.

OBSERV. *Magnitudine var. a paulo minor, cetero huic simillimus.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 188. N:o 3. Elaphrus. Rupestris.*

LYNN. *Syst. Nat. II. p. 653. N:o 12. Cicindela Rupestris: sed hujus generis & thorax haud globosus.*

N:o LIV.

CARABUS SUBGLOBOSUS.

Niger, thorace obscure subæneo subgloboso postice angustato, elytris punctato-striatis: maculis quatuor palidis discoidalibus,

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *nucha* obscure subænea; *Oculi* prominuli; *Antennæ* sæpius basi ferrugineæ.

THORAX supra obscure subæneus, globosus, vix marginatus, glaberri-
mus, postice angustatus: lineola nulla longitudinali, punctis ordinariis minoribus.

ELY-

ELYTRA thorace latiora, nigra, nitida, subtilissime punctato-striata: maculis utrinque duabus discoidalibus minoribus, orbiculatis, altera bascos, altera apicis.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES pallidi; *Femora* rarius nigra.

MAGNIT. inter minores est, seu magnitudine Car. Meridiani.

Locus: Habitat in putridis.

SYNON. LINN. *Syst. Nat.* II. p. 158. N:o 13. *Faun. Sv.* N:o 151. *Cicind. quadrimaculata*, quæ certe hujus generis est.

VAR. β .

Niger, nucha thoraceque obscure subæneis, elytris basi macula orbiculata postica, pedibus pallide ferrugineis.

Locus: Habitat cum var. α , cui magnitudine, habitu & statura omnino similis.

OBSERV. Differt a Car. *Ustulato*, thorace subgloboso postice angustato, punctis ordinariis minoribus.

CARABUS QVADRIGUTTATUS.

Niger subdepressus, lævissimus, thorace punctis ordinariis nullis, elytris oblique truncatis: punctis quatuor albis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thoracis latitudine.

THORAX niger, subdepressus, marginatus, impunctatus, lineola longitudinali non nisi oculo armato conspiciua.

ELYTRA nigra, lævislima, oblique truncata, abdomen tamen obtegentia: punctis utrinque duobus albis, anteriore majore.

ALÆ albicantes.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES nigri; Tibiæ interdum pallidiores.

MAGNIT. Car. Truncatellum æquiparat.

LOCUS: Habitat in Svecia australi rarius.

OBSERV. Differt a Car. Ustulato, magnitudine minori, thorace impunctato elytrisque lævis-

visfimis; a Car. Subgloboso, corpore magis depresso, & elytris laevissimis.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 205. N:o 114 Car. Quadriguttatus.

N:o LVI.

CARABUS RIPARIUS.

Niger nitidus, elytris convexis integris striatis impunctatis: macula utrinque apicis albo-fenestrata; pedibus piceis;

DESCRIPTIO,

CAPUT nigrum, nitidum, thoracis latitudine; *Oculi* parum prominuli.

THORAX niger, nitidus, vix marginatus, glaberrimus, antice truncatus, postice rotundatus, punctis ordinariis profundioribus.

ELYTRA nigra, integra, glaberrima, thorace paulo latiora, subtilissime striata, impunctata: macula parva versus apicem, non tamen in ipso apice, albo-fenestrata.

STER-

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES picei.

MAGNIT. inter minimos est, & Car. Truncatello fere minor.

LOCUS: Habitat ad ripas arenosas, præsertim in Norrlandia.

OBSERV. Differt a Car. Subgloboso, colore elytris-
que impunctatis.

N:o LVII.

CARABUS QVADRISTRIATUS.

*Niger, elytris disco utrinque quadri-
striato, limbo exteriori glaberrimo,
pedibus pallidis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, thorace angustius; *Antennæ Palpique* basi pallidi.

THORAX niger, nitidus, marginatus, lineola longitudinali.

ELYTRA nigra, nitida, integra, thorace latiora: striis quatuor subtilissime
pun-

punctatis discoidalibus ad marginem internam, apicem haud attingentibus: limbo omni exteriori glaberrimo.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES rufo-pallidi.

MAGNIT. Car. Truncatello paulo major est.

Locus: Habitat in Svecia australi.

V A R. β.

Nigro-fuscus, thorace elytrisque obscure castaneis: striis quatuor, discoidalibus; limbo glaberrimo, pedibus pallidis.

Locus: Habitat cum varietate praecedente, cui magnitudine, facie & statura simillimus.

SYNON. SCHRANK. *Enum. Inf. Austria. p. 818. N:o 410. Car. Quadristriatus.*

V A R. γ.

Totus niger, pedibus concoloribus, elytris quadristriatis: limbo exteriore glaberrimo.

Locus: Habitat passim. Simillimus facie & statura praecedentibus, sed paulo minor.

OBSERV. Species haec ab omnibus dignoscitur elytris quadristriatis, limbo glaberrimo.

N:o LVIII.

CARABUS SECALIS.

*Ferrugineus, pedibus pallidioribus,
elytris integris striato-punctatis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT ferrugineum! *Oculi nigri.*

THORAX rufus, marginatus, glaberrimus, antice posticeque truncatus, latitudine fere elytrorum: punctis ordinariis minoribus, lineola longitudinali levissima.

ELYTRA ferruginea, integra, punctato-striata.

ALÆ albo-hyalinæ.

STERNUM ferrugineum.

ABDOMEN ferrugineum.

PEDES flavo-pallidi.

MAGNIT. Car. Truncatello paulo major.

LOCUS: Habitat in agris fecalinis mense septembri frequens, an larva ejus fegeti nocet?

OBSERV. Color ferrugineus in fuscum interdum transit.

VAR. β .

V. A. R. β .

*Niger pedibus pallidis, thorace elytrorumque
futura ferrugineis.*

Locus: Habitat rarissime cum var. præcedenti, cui, colore excepto, adeo similis, ut distingvi nequeat.

N:o LIX.

CARABUS MERIDIANUS.

Niger elytris integris striatis basi suturaque testaceis, antennis basi pedibusque ferrugineis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum: *Antennæ Palpique* basi ferruginei.

THORAX niger, nitidus, marginatus, lineola longitudinali, punctis ordinariis impressis, convexus, rotundatus, antice posticeque truncatus.

ELYTRA abdomen obtegentia, striata, nitida, basi late, & futura tenuissime testacea.

ALÆ

ALÆ albo-hyalinæ.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES ferruginei.

MAGNIT. Car. Truncatellum paulo superat.

Locus: Habitat sub foliis putridis.

SRNON. LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 673. N:o 36. *Faun. Sv.* N:o 797. Car. *Meridianus*.

VAR. β.

Niger, elytris macula bascos in angulo exteriore pedibusque ferrugineis.

Locus: Habitat cum var. α, cui habitu, magnitudine & statura omnino simillimus.

SRNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 205. N:o 111. Car. *Meridianus*.

DE GEER *Inf. t. IV.* p. 102. N:o 20. Car. *Bimaculatus*.

VAR. γ.

Niger, thoracis margine pallido, elytris pallidis: macula magna dorsali fere communi, nigra; antennis basi pedibusque ferrugineis.

Locus: Habitat cum varietatibus præcedentibus, quibus, colore excepto, simillimus.

SRN-

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 205. N:o 116. Car. Dor-*
salis.

N:o LX.

CARABUS FASCIATUS.

Testaceus capite nigro, elytris lævis-
simis flexilibus truncatis: fascia
obliqua fusca.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum: *Antennæ Palpi-*
que ferruginei.

THORAX flavo-ferrugineus, marginatus,
antice posticeque truncatus, po-
stice angustatus, punctis ordina-
riis impressis.

ELYTRA thorace non multo latiora, de-
pressa, flexilia, truncata, abdo-
mine paulo breviora, lævisima,
testacea: fascia pone medium ob-
liqua fusca.

STERNUM flavo-testaceum.

ABDOMEN flavo-testaceum: lateribus & in-
terdum apice fusciscentibus.

PEDES testacei.

G

MAGNI-

MAGNIT. inter minimos est, seu magnitudine sequentis.

LOCUS: Habitat sub lapidibus & foliis putridis, tempore vernali.

OBSERV. *Affinis videtur Car. Andreae, sed multo minor, nec thorax niger, & elytra apice fusca.*

N:o LXI.

CARABUS TRUNCATELLUS.

*Supra obscure subæneus, subtus niger,
elytris lævisimis oblique truncatis
abdomine brevioribus.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *nucha* obscure subænea, thoracis latitudine.

THORAX obscure subæneus, marginatus, antice paulo latior, postice punctis ordinariis impressis.

ELYTRA obscure subænea, lævisima, anteriore parte thoracis vix latiora, abdomine breviora, postice obliq

supra obscure subæneus, marginatus, lineola longitudinali profundiori, nudis oculis conspicua punctisque ordinariis.

ELYTRA obscure subænea, thorace latiora, integra; oculo armato subtilissime punctato-striata apparent; punctis utrinque duobus majoribus impressis, altero anteriori, altero posteriori, nudis oculis bene conspicuis.

ALÆ albo-hyalinæ.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES nigri.

MAGNIT. paulo major est præcedenti.

Locus: Habitat in quisquiliis.

Synon. LINN. *Syst. Nat.* II. p. 672. N:o 33. *Faun. Sv.* N:o 806. *Car. Bipunctatus.*

OBSERV. *A sequenti, seu Car. Bipunctato FABRICII diversissimus.*

N:o LXIII.

CARABUS RUFIPES.

*Supra obscure subæneus, subtus niger,
pedibus rufis, thorace glaberrimo,
elytris integris subtilissime pun-
ctato-striatis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT thoracis fere latitudine, subtus ni-
grum, *nucha* obscure subænea:
Antennæ, Maxillæ, Oculi Palpique
nigri.

THORAX glaberrimus, vix marginatus, ma-
gis quam in præcedente conve-
xus, lineola longitudinali levis-
sima nudis oculis inconspicua,
punctisque ordinariis impressis.

ELYTRA obscure subænea, thorace vix la-
tiora, oculo armato subtilissime
punctato-striata, punctis vero ma-
joribus nullis excavatis.

ALÆ albo-hyalinæ, breviores.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES: *Femora* rufa: *Tibiæ Tarsique* pal-
lidiores.

MAGNIT. præcedentis.

LOCUS: Habitat in Svecia australi.

OBSERV. Differt a Car. Bipunctato, cui affinis, colore pedum, thorace glabriore, nec ulla lineola thoracis punctave excavata elytrorum nudis oculis conspicua. Convenit huic omnino descriptio FABRICIANA, quæ puncta bina excavata elytrorum non exhibet; mihi quoque a Celeb. illo Austrore sub nomine Car. Bipunctati missus.

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 205. N:o 121. Carab. Bipunctatus.

N:o LXIV.

CARABUS AGILIS.

Rufus, abdomine postice fusco, elytris depressis fuscis, truncatis, striatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT rufum; Oculi nigri.

THORAX rufus, marginatus, lineola levissima longitudinali; pilis quibusdam
ra-

rarioribus, longioribus, marginalibus.

ELYTRA fusca, depressa, striata, truncata, abdomine breviora; angulo posteriore obtuso, interiore acuto.

ALÆ albæ, macula marginali fusca.

STERNUM rufum.

ABDOMEN rufum, apice fusco.

PEDES rufo-flavi.

MAGNIT. Car. Viridanum æquiparat.

LOCUS: Habitat in foliis arborum convolutis.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 204. N:o 99. Car. Agilis.*

V A R. β.

Rufus, elytris pedibusque pallidioribus, capite limboque exteriori elytrorum fuscis.

LOCUS: Habitat cum varietate præcedente, cui, colore excepto, simillimus.

SYNON. QVENSEL *Disfert. Ignot. Insect. Spec. P. I. p. 18. Carab. Arboreus.*

V A R. γ.

Fuscus, subtus, apice abdominis excepto, maxillis, antennis pedibusque rufo-flavus, elytris puncto medio pallido.

Locus; Habitat cum præcedentibus, quibus, colore excepto, simillimus.

VAR. δ.

Testaceus, elytris pallidioribus, capite nigro.

Locus: Habitat apud nos rarius: simillimus præcedentibus, colore excepto.

OBSERV. Variat sterno fusco & testaceo.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 205. N:o 117. Car. *Atricapillus.*

LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 673. N:o 42. Car. *Atricapillus.*

SECTIO TERTIA:

Thorace elongato.

N:o LXV.

CARABUS CEPHALOTES.

Niger elongatus lævis, capite thoracis magnitudine, thorace postice coarctato.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, magnum; *Oculi* pupillati.

THORAX niger, lineola longitudinali, convexus, vix marginatus, postice coarctatus.

ELYTRA nigra, dimidio corpore longiora, oculo armato tenuissime punctato-striata, parte anteriore thoracis vix latiora.

ALÆ amplæ, albo-hyalinæ, basi nervisque flavicantibus.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN elongatum, nigrum.

PEDES mediocres, nigri.

MAGNIT. longitudine Car. Violacei, sed multo angustior.

Locus: Habitat passim sub glebulis agrorum, subque lapidibus circa Upsaliam, mense Augusti.

OBSERV. *Nescio qua ratione Auctores fere omnes hanc speciem apteram esse indicaverint, cum semper alata est, & a Tenebrione Gibbo LINNEI, quem FABRICIUS pro varietate ejusdem habet, certe diversissima.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 198. N:o 39. Car. Cephalotes.*

LINN. *Syst. Nat. II. p. 669. N:o 9. Faun. Sv. N:o 788. Car. Cephalotes.*

SCHÆFF. *Icon. Inf. t. XI. f. 1.*

N:o LXVI.

CARABUS CREPITANS.

Ferrugineus, oculis abdomineque nigris, elytris truncatis nigro-cæruleis.

DESCRIPTIO.

CAPUT ferrugineum, thoracis latitudine; *Antennæ* apice obscuriores: *Oculi* minuti, prominuli, nigri.

THORAX ferrugineus, convexus, marginatus, postice coarctatus, lineola longitudinali.

ELYTRA nigro-violacea, thorace duplo latiora, substriata, apice truncata.

STERNUM nigrum, opacum.

ABDOMEN elytris paulo longius, opacum, nigrum.

PEDES: *Femora & Tibiæ* ferruginea; *Tarsi* fuscescentes.

MAGNIT. Car. Viridanum æquiparat.

LOCUS: Habitat sub lapidibus.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 200. N:o 61. Car. *Crepitans*.

LINN. *Syst. Nat.* II. p. 671. N:o 18. *Faun. Sv* N:o 792. Car. *Crepitans*.

DE GEER *Inf. t. IV.* p. 103. N:o 22 t. 3. f. 18. 19. Car. *Crepitans*.

SCHÆFF. *Icon. t. XI.* f. 13.

N:o LXVII.

CARABUS ANGUSTATUS.

*Cyaneus, sterno, pedibus elytrisque,
apice excepto, ferrugineis, thora-
ce longissimo subcylindrico.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigro-cyaneum, nitidum, magnum:
Antennæ Palpique basi flavicantes.

THORAX cyaneus, subcylindricus, capite
angustior, magis quam in conge-
neribus elongatus.

ELYTRA thorace duplo latiora, vix stria-
ta, truncata, ferruginea, apice
cyanea.

STERNUM ferrugineum.

ABDOMEN cyaneum, nitidum, elytris paulo
longius.

PEDES ferruginei: *geniculi Tarsique* fusi.

MAGNIT. longitudine vix præcedentis, &
multo angustior.

Locus: Habitat in Svecia rarius.

SYNON. *FABR. Mant. Inf. p. 205. N:o 122. Car. An-
gustatus.*

*LINN. Syst. Nat. II. p. 620. N:o 6. Attelabus
Melanurus.*

SE-

SECTIO QVARTA:

Thorace subquadrato.

N:o LXVIII.

CARABUS QVADRISULCATUS.

Niger, thorace punctato trisulcato, elytris sulcis quatuor holosericeo-pubescentibus.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum: *Antenna* apice fuscescentes, *Maxilla* breviores.

THORAX niger, marginatus, angulatus, antice lævis, nitidus, profunde punctatus, dorso sulcis tribus laterilibus abbreviatis; postice subtilissime punctatus, tenuissime holosericeo-pubescentibus, punctis ordinariis nullis.

ELYTRA nigra, subtilissime punctata: sulcis quatuor tenuissime holosericeo-pubescentibus; margo exterior punctis paulo majoribus.

ALÆ

ALÆ albo-hyalinæ.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES breviores, nigri.

MAGNIT. Car. Nitentem æquiparat.

LOCUS: Habitat in Gottlandia rarissime, nec nisi unicum vidi in Museo Academiæ Upsaliensis.

N:o LXIX.

CARABUS HOLOSERICEUS.

Subtus niger lævis, supra pube tenuissima holosericeus, capite æneo-nitido.

DESCRIPTIO.

CAPUT subtus nigrum, supra æneo-nitidum: *Maxillæ, Antennæ, Palpi Oculique* nigri.

THORAX subtus lævis, niger, supra pube tenuissima holosericea-fuscescente, subtilissime punctatus, marginatus: lineola longitudinali punctisque ordinariis minutis.

ELY-

ELYTRA pube tenuissima holosericeo-fuscescentia, convexa, substriata; subtilissime punctata: punctis quibusdam paulo majoribus margine exteriori.

ALÆ latiores, corpore longiores, albo-hyalinæ nervis ferrugineis; lunula marginali costaque ad lunulam fuscescentibus.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri.

MAGNIT. Carab. Multipunctatum æquiparat.

LOCUS: Habitat in pratis humidis sub lapidibus, primo vere.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 199. N:o. 52. Car. Holosericeus.*

N:o LXX.

CARABUS NIGRICORNIS.

*Niger lævis, thorace capiteque æneis
elytris striatis viridibus: punctis
discoidalibus nullis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT supra viridi-æneum, nitidissimum, subtus nigrum: *Oculi, Maxillæ Palpique* nigri; *Antennæ* longiores, nigræ, primo articulo rufo.

THORAX supra æneus, subtus nigro-violaceus, capite multo latior, oculo armato subtilissime punctatus: lineola longitudinali punctisque ordinariis posticis profundius excavatis.

ELYTRA viridia, striata, convexa, medio thoracis antice haud latiora: punctis discoidalibus nullis.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum, rarius subviolaceum.

PEDES variant: interdum toti nigri: sæpius *Femora* rufa, *Tibiæ Tarque* fuscescentes; interdum *Tibiæ* etiam rufæ.

MAGNIT. præcedentis.

Lo-

Locus: Habitat sub lapidibus & in pratis humidis.

OBSERV. *Statura & habitu Car. Holosericei, sed lavis, & puncta ordinaria thoracis majora.*

STNON. FABR. *Mant. Inf. p. 202. N:o 82. Car. Nigricornis.*

N:o LXXI.

CARABUS CUPREUS.

Subtus niger, supra rubro-æneus, elytris punctis quatuor discoidalibus; posticis excavatis longitudinalibus, thorace punctis utrinque binis.

DESCRIPTIO.

CAPUT supra rubro-æneum, nitidum; subtus cum *Maxillis, Palpis Oculisque* nigrum. *Antennæ* nigrae: primo secundoque articulo ferrugineis, pilis quibusdam longioribus.

THORAX supra rubro-æneus, subtus niger, vel obscure coerulescens, capite
H la-

lterior, marginatus: lineola longitudinali punctisque duobus majoribus aproximatis lateralibus postice impressis.

ELYTRA rubro-ænea, antice thoracis latitudine, in medio latiora, striata punctis minutissimis: punctis quatuor paulo majoribus, licet vix nudis oculis conspicuis in stria secunda a margine interiore, quorum primum in medio, secundum & tertium posteriora, & quartum in ipso apice; margo exterior etiam notatus punctis adhuc majoribus, nudis oculis conspicuis.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES nigri.

MAGNIT. præcedentis.

Locus: Habitat apud nos frequens.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 201. N:o 68. *Car. Cupreus.*

LINN. *Syst. Nat.* 11, p. 672. N:o 29. *Fawn. Sv.* N:o 801. *Car. Cupreus.*

DE GEER *Inf. t. IV.* p. 97. N:o 13. t. 3. f. 15.

VAR. β .

Subtus niger, supra viridi-æneus.

Locus: Habitat cum præcedenti frequens.

SYN.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 200. N:o 66. Car. *Cærulescens.*

LINN. *Syst. Nat.* ii. p. 672. N:o 28. *Faun. Su.*
N:o 800. Car. *Cærulescens.*

VAR. γ.

Totus niger.

LOCUS: Habitat cum præcedentibus frequens.

VAR. δ.

Subtus niger; supra obscure violaceus.

LOCUS: Habitat apud nos rarius.

OBSERV. *Varietates hæ omnes habitu, statura & magnitudine simillimæ.*

N:o LXXII.

CARABUS PROTEUS.

Lævis cylindricus, thorace punctis ordinariis levioribus, elytris strigatis disco impunctatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT crassum, ferrugineum, basi ad collum, æneum: *Antennæ Palpique*

testacei; *Maxilla* validæ, ferrugineæ, apice obscuriores; *Oculi* cinerascetes.

THORAX undique elytrorum latitudine, sub-
tus testaceus, supra æneus, linea
longitudinali punctoque postico u-
trinque unico leviter excavato.

ELYTRA striata: capite thoraceque vix lon-
giora, viridi-ænea, punctis dis-
coidalibus nullis.

ALA albo-hyalinæ, nervis fuscescen-
tibus.

STERNUM testaceum.

ABDOMEN breve, testaceum.

PEDES testacei.

MAGNIT. paulo minor est præcedenti.

LOCUS: Habitat in Svecia australi rarius.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 202. N:o 81. Car.*
Æneus.

VAR. β.

*Niger, subtus ferrugineo-flavescens, capite
rufo, antennis pedibusque flavis.*

LOCUS: Habitat cum præcedente.

LOCUS: FABR. *Mant. Inf. p. 201. N:o 72. Car. Ery-*
throcephalus.

VAR γ.

VAR. γ.

Flavus, thorace supra elytrisque fusciscentibus.

Locus: Habitat in Uplandia rarius.

VAR. δ.

Subtus niger, supra cyaneus, antennis pedibusque rufis.

Locus: Habitat in Svecia australi minus frequens.

OBSERV. Pedes & Antennae interdum fusciscentes.

SRNON. FABR. Mant. Inf. p. 201. N:o 71. Car. Cyaneus.

VAR. ε.

Niger, pedibus antennisque rufis.

Locus: Habitat frequentissime in quisquiliis & sub lapidibus.

SRNON. LINN. Syst. Nat. 11. p. 672. N:o 24. Faun. Sv. N:o 2276. Car. Latus.

DE GEER Inf. t. 4. p. 100. N:o 18. Car. Latus.

SCHRANK Enum. Inf. Austriae. p. 211. N:o 397. Car. Latus: sed major.

GEOFFR. Inf. t. 1. p. 160. N:o 37.

VAR. ζ.

Totus niger.

Locus: Habitat cum præcedenti frequentior.

VAR. 7.

*Niger thorace supra elytrisque viridi-æneis,
pedibus antennisque rufis.*

Locus: Habitat sub lapidibus vulgatio.

OBSERV. Variat pedibus antennisque piceis.

SYNON. SCHRANK *Enum. Inf. Austr. p. 212. N:o 399,*
Car. Affinis,

VAR. 8.

Subtus, cum pedibus antennisque nigro-brun-
neus, capite nigro, thorace supra ely-
trisque viridi-æneis.

Locus: Habitat cum præcedentibus.

SYNON. DE GEER *Inf. t. IV. p. 97. N:o 14. Cara-*
bis Vulgaris: thorax vero postice haud bi-
punctatus.

VAR. 9.

Niger, capite punctis duobus minutissimis
rubris, antennis basi flavis.

Locus: Habitat apud nos rarius.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 199. N:o 55. Car. Bi-*
notatus.

OB-

OBSERV. *Varietates hæ omnes adeo statura, magnitudine & habitu similes, ut omnes ad unam speciem retulerim: an jure? vidi ipse Carabos var. æ. & η. copula junctos.*

N:o LXXIII.

CARABUS ALPINUS.

Niger, thorace punctis ordinariis bilobis, elytris striato-punctatis rufo-ferrugineis: margine maris nigro.

DESCRIPTIO.

CAPUT breve, crasum, nigrum: *Antennæ* basi ferrugineæ.

THORAX niger, subdepressus: lineola longitudinali punctisque ordinariis levioribus utrinque bilobis.

ELYTRA rufo-ferruginea, thoracis latitudine, subtilissime punctato-striata: summo margine omni, anteriore excepto, nigro; margine exteriori nullis punctis distinctis majoribus.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES: *Femora* subclavata & *Tibia* rufo-ferruginea; *Tarsi* fusciscentes.

MAGNIT. Car. Lato paulo minor est.

FEMINA mari simillima, at paulo major, seu magnitudine Car. Lati, & elytra tota rufo-ferruginea, margine concolore, antice impunctato, postice punctis octo distinctis.

LOCUS: Habitat in fummis alpinis Lapponicis & Dalecarlicis.

OBSERV. Differt a Car. Proteo, thorace punctis ordinariis bilobis: a Car. Bicolore, cui similis, colore, magnitudine, loco natali, & margine elytrorum maris impunctata,

N:o LXXIV.

CARABUS RUFICORNIS.

Niger, antennis pedibusque ferrugineis, thorace basi subretuso subrugoso, elytris striatis subtilissime punctatis subvillofis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum: punctis duobus frontibus impressis; *Maxillæ* piceæ: *Antennæ Palpique* ferruginei.

THORAX niger, elytrorum latitudine, linea longitudinali, antice glaber, postice loco punctorum ordinariorum subretusus, levissime rugosus.

ELYTRA nigra, striata, oculo armato unque subtilissime confertissimeque punctata apparent; e puncto singulo pilus brevissimus subflavescentis oritur: hinc elytra undique subtilissime villosa, certo situ flavicantia, micantia; margini insunt puncta nulla distincta majora.

STERNUM piceo-nigrum.

ABDOMEN piceo-nigrum.

PEDES flavo-ferruginei.

MAGNI-

MAGNIT. Car. Cupreo longior & latior.

LOCUS: Habitat sub lapidibus frequens.

OBSERV. *Mares feminis simillimi.*

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 199. N:o 48. Car. Ruficornis.*

GEOFFR. *Inf. t. I. p. 160. N:o 38. Le Buprestia noir velouté.*

N: LXXV.

CARABUS BICOLOR.

Supra niger, subtus cum antennis pedibusque piceo-ferrugineus, thorace postice utrinque bipunctato, elytris punctato-striatis: punctis octo majoribus marginalibus distinctis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, antice punctis duobus impressis: *Maxillæ* piceæ; *Antennæ Palpique* obscure ferruginei.

THORAX latitudine fere elytrorum, subtus piceus, supra niger, convexus:
li-

lineola longitudinali punctoque duplici ordinario impresso.

ELYTRA nigra, convexa, subtilissime punctato-striata: punctis octo majoribus distinctis in ipso margine exteriori a medio ad apicem,

STERNUM piceo-ferrugineum.

ABDOMEN piceo-ferrugineum.

PEDES piceo-ferruginei: *Femora* subclavata; *Tibiae* anteriores subspinosae.

MAGNIT. præcedentem æquiparat.

LOCUS: Habitat sat frequens sub lapidibus.

SYNON. FABR. *Mant. Inf.* p. 199. N:o 49. *Car. Bicolor.*

LINN. *Syst. Nat.* 11. p. 671. N:o 20. *Faun. Sv.* N:o 793. *Car. Spinipes.*

SCHRANK *Enum. Inf. Austr.* p. 212. N:o 398. *Car. Spinipes.*

OBSERV. *Mares feminaeque simillimi. Car. Spinipes est Schrankii, sed synonymon ejus Geoffroyanum N:o VIII. omnino falsum, quia thorax cordatus. An sit Carabus Spinipes LINNÉI, vix discerni potest, cum descriptio ejus anceps sit. Plures etiam inveniuntur manibus spinosis, unde magna confusio orta: Carabus enim Spinipes Sultzerei t. 3. f. 4. Car. Cephalotes auctorum est, & Car. Spinipes Mulleri Zool. Dan. prodr. p. 79. N:o 852. a Car. Spinipede LINNÉI diversissimus.*

N:o LXXVI.

N:O LXXVI.

CARABUS FERRUGINEUS.

*Latus, brevis, ferrugineus, oculis
nigris, thorace punctis ordina-
riis duplicibus, elytris striatis
disco impunctatis.*

DESCRIPTIO.

CAPUT ferrugineum, nitidum: *Oculi nigri.*

THORAX ferrugineus, nitidus lateribus parum rotundatis, in medio elytrorum latitudine: lineola longitudinali punctoque utrinque ordinario duplici.

ELYTRA ferruginea, latiora, nitida, punctato-striata, convexa: margine punctis quibusdam indistinctis, minoribus.

ALÆ albæ, longiores, immaculatæ.

STERNUM ferrugineum.

ABDOMEN ferrugineum.

PEDES ferruginei.

MAGNIT. longitudine vix Car. Protei, sed multo latior.

Lo-

Locus: Habitat in Svecia sub lapidibus minus frequens.

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 201. N:o 76. Car. Ferrugineus.*

LINN. *Syst. Nat. 11. p. 672. N:o 25. Faun. Sv. N:o 798. Car. Ferrugineus.*

V. A. R. β.

Totus pallidus, oculis cinerascentibus.

Locus: Habitat cum præcedenti, cui simillimus; an nuper e nympha declaratus?

SYNON. FABR. *Mant. Inf. p. 201. N:o 77. Car. Pattens.*

N:o LXXVII.

CARABUS APRICARIUS.

Subtus flavus, supra fusco-orichalceus nitidissimus, thorace postice utrinque bipunctato, elytris undique punctato-striatis.

DESCRIPTIO.

CAPUT subtus flavum, *nucha* fusco-orichalcea, nitida: *Maxillæ, Antennæ Palpique* ferruginei: *Oculi* nigri.

THO-

THORAX subtus flavus supra fusco-orichalceus, nitidissimus, vix marginatus, in medio latitudine elytrorum: lineola longitudinali punctoque utrinque duplici ordinario.

ELYTRA fusco-orichalcea, nitidissima, punctato-striata: summo margine exteriori subtus flavo, punctis marginalibus majoribus vix ullis distinctis.

STERNUM flavum.

ABDOMEN flavum.

PEDES flavi.

MAGNIT. longitudine Car. Pilicornis, sed latior.

Locus: In colle arenoso Dalecarliæ, in aprico semel plures inveni.

Synon. DE GEER *Inf. t. IV. p. 101. N:o 19. Car. Fulvus.*

GEOFFR. *Inf. t. I. p. 162. N:o 43. Le Bu-preste fauve.*

VAR. β .

Supra rufo-piceus, subtus cum antennis pedibusque rufus.

Locus: Habitat in Uplandia.

OBSERV. Simillimus precedenti, colore excepto. Differt a Car. Ferruginæ, elytris punctato-stria-

*striatis, unde etiam synonyma GEOFFRO-
JANA & DE GEERIANA ad hanc spe-
ciem retuli. A Car. Bicolore, cui statu-
ra, & var. β . colore nimis affinis vi-
detur, differt magnitudine triplo minore
marginisque baud octo punctato; nec va-
rietas ejus sexus habeatur, quia mares
& feminae, ut antea monui, invicem si-
millimi sunt.*

N:O LXXVIII.

CARABUS ATERRIMUS.

*Niger nitidissimus, thorace convexo,
elytris levissime punctato-striatis:
punctis utrinque tribus discoida-
libus majoribus.*

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, *nucbâ* nitidissima.

THORAX dorso nitidissimus, convexus, mar-
ginatus, antice acute, postice ob-
tuse angulatus, lineola longitudi-
nali; postice loco punctorum or-
dinariorum profunde excavatus.

ELY-

ELYTRA nigra, nitidissima, thorace vix latiora, convexiora, levissime striato-punctata: striis opacioribus, unde nudis oculis perspiciuntur; in singulo elytro puncta tria profundiora nudis oculis optime perspicua, quorum duo in stria secunda a margine interiore, alterum in medio, alterum postice, & tertium basi propius in stria tertia; margo exterior etiam punctis minoribus, inermi tamen oculo conspicuis adornatur.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES nigri, nitidi.

MAGNIT. Car. Ruficornem vix æquiparat.

LOCUS: Habitat sub lapidibus primo vere.

OBSERV. Totus supra nitidissimus, quasi oleo unctus. Ceterum etiam a Carabo Striato differt thorace subquadrato; a sequenti elytris convexioribus, levissime punctato-striatis, punctisque discoidalibus majoribus nudis oculis optime perspicuis.

SYNON. Carabus Aterrimus. Herbst.

N:o LXXIX.

CARABUS NIGRITA.

Niger nitidus, thorace utrinque postice subretuso, elytris striatis: punctis utrinque tribus discoidalibus minutissimis; marginalibus majoribus.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum, nitidum: Oculi fuscescentes.

THORAX niger, nitidus, marginatus, lineola longitudinali, punctis ordinariis profunde retusus.

ELYTRA nigra, nitida, striata: in stria secunda a margine interiore puncta duo vix nudis oculis conspicua, quorum alterum in medio, alterum postice, & in stria tertia punctum tertium basi propius; totus margo exterior etiam punctatus: punctis paulo majoribus nudis oculis conspicuis.

STERNUM nigrum, nitidum.

ABDOMEN nigrum, nitidum.

PEDES: Femora & Tibiæ nigra: Tarsi fuscescentes.

I

MAGNI-

MAGNIT. longitudine Car. Protei, sed paulo angustior; reperiuntur quoque duplo fere minores, ceterum simillimi, vix specie diversi.

Locus: Habitat sub lapidibus frequens.

OBSERV. *Mares feminis simillimi præter puncta marginalia maris distinctiora. Ab Auctoribus cum Car. Leucophtbalmo confusus videtur, apterus vero hic, ille alatus; differt etiam a Car. Striato, cui affinis, magnitudine duplo minore, & thorace subquadrato.*

N:o LXXX.

CARABUS AMBIGUUS.

Supra niger, subtus piceus, pedibus flavis, elytris thoraci adnatis: punctis utrinque duobus discoidalibus.

DESCRIPTIO.

CAPUT supra nigrum, nitidum, subtus piceum: *Antennæ Palpique* rufo-fuscescentes.

THO-

THORAX subtus piceus, supra niger: lineola longitudinali punctoque utrinque ordinario levissimo, elytrorum latitudine, iisdemque arte junctus.

ELYTRA nigra, thorace paulo opaciora, striata: punctis utrinque duobus discoidalibus nudis oculis inconspicuis, & quibusdam paulo majoribus in margine exteriori.

ALÆ longiores, albo-hyalinæ, immaculatæ.

STERNUM piceum.

ABDOMEN piceum.

PEDES flavi, interdum rufi.

MAGNIT. Carabum Flavipedem æquat.

LOCUS: Habitat sub lapidibus, juxta agros Upsaliæ. S. TÖRNER.

OBSERV. *Variat variis punctis elytrorum discoidalibus utrinque tribus.*

Statura & habitus omnino Car. Flavipedis.

N:o LXXXI.

CARABUS OVATUS.

Ovatus, thorace antice capitis, postice elytrorum latitudine utrisque adnato, elytris striatis: punctis discoidalibus nullis.

DESCRIPTIO.

CAPUT nigrum: *Oculi* pupillati; *Antennæ* sæpius basi rufescentes.

THORAX basi latitudine capitis, postice latitudine elytrorum, convexus, vix marginatus: lineola longitudinali punctisque ordinariis rarius duplicibus, levioribus.

ELYTRA nigra, antice truncata, thorace arcte juncta, striata, dimidio corpore longiora: margine exteriori subpunctato, punctis discoidalibus nullis.

ALÆ albæ: venis nigris, macula marginali fusca.

STERNUM nigrum.

ABDOMEN nigrum.

PEDES nigri.

Locus: Habitat frequens sub lapidibus.

SrN.

SYNON. LINN. Faun. Sv. N:o 799. Car. Vulgaris var. β .

V A R. β .

*Supra obscure æneus, subtus cum antennis
pedibusque piceus.*

SYNON. FABR. Mant. Inf. p. 201. N:o 70. Car. Vulgaris,

LINN. Syst. Nat. II. p. 672. N:o 27. Faun.
Sv. N:o 799. Car. Vulgaris var. α .

V A R. γ .

Supra viridi-æneus, subtus niger.

V A R. δ .

Supra nigro-cærulescens, subtus niger nitidus.

SYNON. DE GEER Inf. t. IV. p. 98. N:o 15. Car.
Æneus.

OBSERV. Omnes hæ varietates habitu & statura
simillimæ, sed magnitudo speciei variat.
Jam longitudine Carab. Protei, jam duplo fere brevior, semper vero, ratione magnitudinis multo latior est.

A P P E N D I X *).

STAPHYLINUS.

11-12. **S. ALPINUS:** *niger nitidus, elytris pedibusque testaceis, antennis mediocribus.*

Descr. Caput thorace latius, nigrum, nitidum: Oculi globosi; Palpi rufi; Antennae dimidii corporis longitudine, basi rufæ. Thorax niger, nitidus, capite elytrisque angustior. Elytra depressa, testacea, subtilissime punctata, capitis thoracisque longitudine. Alæ albæ. Sternum & Abdomen nigra, nitida. Pedes testacei.

Magnitudo: St. Caraboidis fere longitudine sed angustior.

Locus: hab. in falicibus alpium Dalecarliæ, præsertim in monte Stådjan, mense Junii.

Obs. Summa affinitas St. Caraboidis, sed omnino differt colore, loco natali, antennis brevioribus, & corpore angustiore.

N:o 14-15.

*) Post editam typis, exacto anno, Staphylinorum Monographiam, partim ipse reperi, partim amicis acceptas refero Species non nullas ejusdem generis novas, in patria nuper detectas, quarum descriptiones, omni abjecta cunctatione huic opellæ subungere liceat, Pertractaturus, si fata sinant, proxima Monographia, Curculiones Sveciæ, pari modo ejusdem clausulæ Caraborum Species inferere constitui, quæ harum numero desiderantur, quasque ad illud tempus aliorum Entomologorum opera benigne mecum communicatas, gratus agnovero.

N:o 14-15. *S. PILICORNIS*: *niger, labio pedibusque brunneis, antennis pilosis, elytrorum sutura unistriata.*

Descr. Caput thorace vix latius, nigrum nitidum, subrotundatum: *labium p. lpi-que* brunnea; *Antennæ* pilosæ capitis thoracisque fere longitudine. *Thorax* niger, nitidus, convexus, postice rotundatus, antice vix angulatus. *Elytra* nigra, nitida, thoracis longitudine: stria utrinque unica futurali. *Sternum* nigrum. *Abdomen* nigrum, nitidum, dimidii corporis fere longitudine. *Pedes* rufobrunnei.

Magnitudo: cum varietate β . St. Fulgidi æmulatur.

Locus: habitat sub cortice truncorum pini. Dom. GYLLENHAL.

Obs. Differt ab omnibus St. nigris, antennis pilosis, elytrisque margine futurali unistriato.

N:o 17-18. *St. FRACTICORNIS*: *niger, pedibus rufis, antennis fractis subclavatis, thorace brevioris postice rotundato.*

Descr. Caput thoracis latitudine nigrum, opacum: *Antennæ* capite thoraceque breviores, fractæ: primo articulo ut in quibusdam Curculionibus, longissimo, apice incrassatæ. *Thorax* niger, subtilissime punctatus, convexus, postice rotundatus, longitudine latitudinis. *Elytra* nigra, subtilissime punctata, thorace vix longiora. *Alæ* albæ. *Sternum & Abdomen* nigra: ano obsole-

lete rufescēte. *Pedes* fusco-brunnei. *Magnitudo* St. Orbiculatum æquiparat. *Locus*: hab. in Vestrogothia; tempore vespertino volitans in arvis. Dom. GYLLENHAL.

Obs. differt St. Glaberrimo, antennis subclavatis, thorace breviorē, rotundiorē, opaciorē; a reliquis nigris, antennis fractis.

V A R. β.

Niger, antennis fractis apice incrassatis, pedibus rufis, elytris rubris, margine omni, posteriore excepto, nigro.

Locus: habitat cum præcedenti, cui colore excepto, simillimus.

N:o 17-18. St. GLABERRIMUS: *niger*, pedibus fusco-pallidis, antennis fractis filiformibus, thorace longiorē.

Descr. Caput nigrum, nitidum, elongatum; *Antennæ* fractæ, filiformes, capitibus thoracisque vix longitudine: primo articulo longissimo. *Thorax* niger, nitidus, latitudine longior. *Elytra* nigra, thorace opaciora, subtilissime punctata, thoracis longitudine & latitudine. *Sternum* nigrum. *Abdomen* nigrum, dimidii corporis longitudine. *Pedes* fusco-pallidi.

Magnitudo vix St. Quadratum attingit.

Locus: habitat sub muscis & lapidibus, locis subhumidis tempore vernali in Vestrogothia. Dom. GYLLENHAL; in Uplandia. ipse.

SYNON. St. Glaberrimus, Herbst. in Fueslis Insecten-archiv.

N:o 34-35.

N^o 34-35. *St. SUBSTRIATUS: rufus, capite elytrisque nigris, elytris substriatis.*

Descr. Caput thorace paulo angustius, nigrum, nitidum: *Palpi* rufi; *Antennae* rufae, capite thoraceque breviores, vix extrorsum crassiores. *Thorax* rufus, glaberrimus, longitudine latior, antice posticeque truncatus. *Elytra* nigra, subdepressa, thorace longiora, substriata. *Sternum* rufum. *Abdomen* rufum, subpilosum, longitudine dimidii corporis. *Pedes* breviores, rufi.

Magnitudo: *St.* Tricornem æquiparat.

Locus: habitat sub cortice arborum Vestrogothiæ rarius. Dom. GYLLENHAL.

Obs. colore & elytris substriatis optime dignoscitur.

N^o 34-35. *St. CINCTUS: niger nitidus, elytris punctis longitudinalibus triplici serie excavatis: margine ferrugineo.*

Descr. Caput thorace angustius, nigrum, nitidum: *Antennae* filiformes capitis thoracisque longitudine. *Thorax* convexus, niger, nitidus. *Elytra* thorace paulo longiora, nigra, nitida, margine tenuissimè ferrugineo, punctis vix nudis oculis conspicuis triplice serie excavatis. *Sternum* nigrum. *Abdomen* nigrum, vix thoracis elytrorumque longitudine. *Pedes* nigri.

Magnitudo *St.* Variantem var. α , cui statura similis, paulo superat.

Locus: hab. in Svecia australi rarius.

K

N^o 53-54.

N:o 53-54. St. PUBESCENS: *fuscus pubescens, pedibus, thoracis lateribus elytrorumque basi pallidis, penultimo segmento abdominis reliquis haud longiore.*

Descr. Caput thorace angustius, nigrum, minutum: Palpi pallidi; Antennae capite thoraceque longiores. Thorax magnus, convexus, fuscus lateribus pallidis, undique hirsutis, brevissima tectus. Elytra capitis thoracisque longitudine, fusca, tenuissime villosa; basi macula pallida futuram haud attingente. Sternum fuscum. Abdomen fuscum, in vivo conicum, acuminatum, longissimum. Pedes pallidi. Magnitudo & statura St. Disparis, a quo differt corpore omnino pubescente, & penultimo segmento abdominis brevior.

Locus: habitat in putridis & cellis subterraneis.

VAR. β .

Fuscus pubescens, pedibus pallidis.

Locus: hab. cum var. praecedenti, cui simillimus, ut separari nequeat.

EMENDANDA.

- p. 9. lin. 14. legatur *levioribus*
 13. l. 7. leg. *rugose punctato-friatis*
 19. l. 4. hæc observatio referatur ad var. sequentem β . pone Locum.
 23. l. 3. *Elytris viridi-æneis*
 88. l. 4. *Elaphrus*
 104. l. 2. *simillimus*
 123. l. 21. *falsum*
 127. l. 13. *levisime*

